

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة 8 ماي 1945 قالمة

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

قسم العلوم التجارية



مطبوعة خاصة بمقياس

الإحصاء II

SAHLA MAHLA

المصدر الأول للطالب الجزائري



إعداد:

د. سماعيل فوزي

د. بشيشي وليد

السنة الجامعية: 2020/2019

فهرس المحتويات

القسم الأول: التحليل التوافقي

_ التبادل. *Les Permutations*

_ الترتيب. *Les Arrangements*

_ التوافيق. *Les Combinaisons*

القسم الثاني: أساسيات الاحتمال

التجربة

التجربة النظامية

التجربة العشوائية

القوانين الأساسية في الاحتمال

جمع الاحتمالات:

أولاً: حالة الأحداث المتنافية:

ثانياً: حالة الأحداث غير المتنافية:

القسم الثالث: الاحتمال الشرطي ونظرية بايز

Conditional Probability And Bay's Theorm.

نظرية التجزئة *Theorm*

نظرية بايز. *Bay's Theorm.*

القسم الرابع: المتغيرات العشوائية والتوزيعات الاحتمالية

المتغير العشوائي المتقطع (المنفصل)

تابع التوزيع *Probability Distribution Function*

دالة التوزيع *Cumulative Distribution Function*

التوقع الرياضي والانحراف المعياري *Mathematical Expectation*

Continuous Probability Distributions المتغير العشوائي المستمر (المتصل)

The Discrete Probability Distributions التوزيعات الاحتمالية المنفصلة

The Binomial Distribution اولا: التوزيع ذي الحدين الاحتمالي

The Poisson Distribution ثانيا: التوزيع البواسوني

SAHLA MAHLA

المصدر الاول للطالب الجزائري



القسم الأول: التحليل التوافقي

يهدف التحليل التوافقي الى تحديد عدد الطرق الممكنة للمجموعة ضمن شروط معينة وبقواعد رياضية تسهل هذا التكوين من جهة وتمكن من دراسة المجموعات المنتهية من خلال تبسيط العد بها واستنباط طرق أكثر فعالية لحساب عدد الحالات المواتية (الملائمة) وعدد الحالات الممكنة المرتبطة بذلك الحادث، وبالتالي يصبح حساب الاحتمالات من أهم التطبيقات العملية للتحليل التوافقي، وعليه فانه سيتم في هذا المحور التركيز على الموضوعات التالية:

_ التبادل. *Les Permutations*

_ الترتيب. *Les Arrangements*

_ التوافيق. *Les Combinaisons*

وقبل التطرق الى هذه المواضيع لابد من التطرق الى مبدأ طرق العد

مبدأ طرق العد

مبدأ الضرب: يعتمد مبدأ طرق العد على أنه إذا أمكن القيام بعمل ما بـ n_1 طريقة

مختلفة، وإذا أمكن القيام بعمل آخر بـ n_2 طريقة مختلفة وهذا من أجل كل طريقة من الطرق


السابقة فيمكن القيام بالعملين معا _ بأن واحد _ بعدد من الطرق مساو الى $n_1 \times n_2$ طريقة

ممكنة. ويمكن تعميم هذا المبدأ على أكثر من عاملين، والمثال التالي يوضح ذلك.

إذا كان لدينا ثلاث طرق للوصول من مدينة قلمة إلى الجزائر، ومن الجزائر إلى وهران لدينا طريقين فما هي عدد الطرق الممكنة للوصول إلى وهران.

حتى يتم تحليل التمرين وفهمه أكثر سندرج المخطط التالي:

حيث أننا سنرمز للطرق المؤدية إلى الجزائر بالرمز $G_1 G_2 G_3$ على الترتيب أما الطرق المؤدية إلى وهران بالرمز التالي $O_1 O_2$ على الترتيب



من خلال الشكل نلاحظ أن عدد الطرق المؤدية إلى ولاية وهران هو 6 طرق وبالتالي العملية التي يمكن تطبيقها هي: عدد الطرق في المرحلة الأولى ضرب عدد الطرق في الحالة الثانية

$$n_1 \times n_2 = 2 \times 3 = 6$$

وإذا كان لدينا أكثر من مرحلتين فتكون القاعدة كالتالي:

$$n_1 \times n_2 \times n_3 \dots \dots \dots n_N$$

{2}

مبدأ الجمع: إذا كنا نريد حدوث طريقة واحدة إما الحدث الأول أو الحدث الثاني وليس حدوث الاثنين معا فإن ذلك يطلب استخدام الجمع ولي الضرب أي: $(N_1 + N_2)$ طريقة.

مثال: إذا أراد السفر إلى مدينة وهران من مدينة قلمة ولديه أربع طرق إذا اتخذ طريق عنابة وثلاث طرق إذا تبع طريق قسنطينة، بكم طريقة يمكن أن يصل إلى وهران.

الحل: عدد الطرق الممكن اتباعها هو $4 + 3 = 7$

الفرق بين هذا المثال والمثال السابق أنه في الحالة الأولى كان لا بد وأن يتم دمج طريقين حتى الوصول، لذلك استخدمنا الضرب، أما في هذا المثال فكل طريق مستقل عن الآخر وبالتالي استخدمنا عملية الجمع.

ملاحظة:

عند استخدام (و) نقصد عملية الضرب مثلا في المثال الأول نستخدم طريق قلمة الجزائر والطريق الأول إلى وهران، في هذه الحالة استخدمنا حرف (و) وبالتالي نعوضه بعملية الضرب.

عند استخدام (أو) نقصد عملية الجمع مثلا في المثال الثاني نستخدم أحد الطرق فلا يوجد ارتباط بين الطرق، أي نستخدم الطريق الأول أو الثاني وبذلك نستخدم عملية الجمع

المصدر الأول للطالب الجزائري

1_ التبادل. Les Permutations

يمكن أن نميز في التبادل بين حالتين مهمتين وهما:

_ التبادل دون تكرار

_ التبادل مع التكرار

1_1 التبادل دون تكرار

يمكن أن نسمي ترتيب N من العناصر المختلفة بأنه تبديلة هذه العناصر مأخوذة K في كل مرة، بشرط أن تؤخذ جميع العناصر أي $N = K$. أي عدد المجموعات التي يمكن تشكيلها من هذه العناصر التي تختلف باختلاف ترتيب هذه العناصر على الأقل، ويعبر عنها بالعلاقة التالية:

$$p_n = n!$$

$n!$: يقرأ n عاملي أو مضروب n . حيث أن:

$$n! = n \times (n - 1) \times (n - 2) \times (n - 3) \times (n - 4) \times \dots \dots \dots (n - n)!$$

$$0! = 1$$

$$1! = 1$$

$$2! = 2 \times (2 - 1) = 2$$

$$3! = 3 \times (3 - 1) \times (3 - 2)$$

$$4! = 4 \times (4 - 1) \times (4 - 2) \times (4 - 3)$$

$$10! = n \times (10 - 1) \times (10 - 2) \times (10 - 3) \times (10 - 4) \times \dots \dots \dots (10 - 9)$$

مثال:

ماهي عدد الطرق الممكنة لترتيب الأرقام التالية دون تكرار: $n = \{1; 2; 3\}$

الطرق الممكنة الكلية دون تكرار هي كالتالي:

$$\{1; 2; 3\}$$

$$\{1; 3; 2\}$$

$$\{2; 1; 3\}$$

$$\{2; 3; 1\}$$

$$\{3; 1; 2\}$$

$$\{3; 2; 1\}$$

نلاحظ أن عدد الطرق الممكنة لترتيب هذه الأرقام هو 6 طرق، كل طريقة من هذه الطرق تسمى تبديلة، بمعنى أنه لدينا 6 تبديلات ممكنة لهذه الأرقام دون تكرار

$$\{4\}$$

ويمكن حسابها بالطريقة التالي:

$$p_3 = 3! = 3 \times (3 - 1) \times (3 - 2) \times (3 - 3)!$$

أي

$$p_3 = 3! = 3 \times 2 \times 1 \times 0!$$

ومنه:

$$p_3 = 3! = 6$$

ملاحظة

بالنسبة للتكرار ليس من الضروري ان يكون في المعطيات لأنه في بعض الحالات لا يحدد لنا هل التبديل دون اكرار ام لا لأنه يستحيل فيه الترار مثلاً ترتيب مجموعة من الكتب في هذه الحالة التكرار مستحيل لانهل ايمن وضع كتاب في نفس الوقت في عدة ترتيبات

في حالة العدد الكلي اكبر من الترتيبات، مثلاً تشكيل كلمة مكونة من ثلاث حروف مع العلم ان الحروف المتاحة هي خمسة حروف، يمكن تعريف ذلك كما يلي:

نفرض أن لدينا n مقعداً مرقماً وهناك N شخصاً لمعرفة عدد الطرق المختلفة التي يمكن بها ملء المقاعد. المقعد الأول له N طريقة، والثاني له $N - 1$ طريقة، والثالث $N - 2$ طريقة وهكذا حتى المقعد الأخير ويمكن لأن يملأ بـ $N - (n + 1)$ طريقة.

أي أن: عدد الطرق المختلفة لملء المقاعد هو

$$N(N - 1)(N - 2)(N - 3) \dots (N - 1)$$

$$P_n^N = \frac{N!}{(N-n)!}$$

هذا العدد يسمى N تباديل n (N permutation) ويرمز له بالرمز P_n^N

أي

مثال: ماهي عدد الكلمات التي يمكن تشكيلها من هذه الحروف A B C D E إذا كان:

$$\{5\}$$

1 إذا كانت الكلمة مكونة من خمسة حروف لا يهم المعنى

2 إذا كانت الكلمة مكونة من ثلاثة حروف لا يهم المعنى

الحالة الأولى: عدد الحروف الإجمالي يساوي العدد المطلوب تشكيل كلمة منه وبالتالي تكون كالتالي:

$$p_5 = 5! = 5 \times (5 - 1) \times (5 - 2) \times (5 - 3) \times (5 - 4) \times (5 - 5)!$$

$$p_5 = 5! = 120$$

ومنه

بمعنى أن هناك 120 تبديلة يمكن تشكيل بها هذه الحروف الخمسة من إجمالي خمسة حروف وذلك دون تكرار الحرف

$$P_n^N = \frac{N!}{(N-n)!} \text{ أي:}$$

حيث أن N هي العدد الإجمالي و n هي العدد الذي يراد ترتيبه

وبما أن العدد الإجمالي للحروف هو $N = 5$ وعدد الحروف المطلوب إيجاد عدد التباديل الممكنة لها

هو $n = 5$

ملاحظة يمكن حل العملية باستخدام القانون التالي: $P_n^N = \frac{N!}{(N-n)!}$ أيضا

$$P_5^5 = \frac{5!}{(5-5)!} = 5! = 120$$

الحالة الثانية: عدد الحروف الإجمالي أقل من العدد المطلوب تشكيل كلمة منه وبالتالي تكون


كالتالي:

$$P_3^5 = \frac{5!}{(5-3)!} = \frac{5!}{2!} = \frac{5 \times 4 \times 3 \times 2!}{2!} = 5 \times 4 \times 3 = 60$$

أي أن عدد التباديلات الممكنة لثلاثة حروف من خمسة حروف هو 60 تبديلة ممكنة دون تكرار

التبديل الدائرية

حتى يتم فهم التباديل الدائرية لابد ان نطلع على الشكل التالي:




من خلال الشكل أعلاه نلاحظ انه يبدو ان هناك تباديل متغيرة وذلك بإزاحة كل لون رتبة واحدة الا ان كل لون بقي من قبله وبعده نفسهم أي وكاه م إدارة الدائرة

لكن إذا كانت هذه الألوان في ط مستقيم وتم ازاحتها درجة واحدة كالتالي نجد أنه حدث تغير فاللون الاسود مثلاً كان قبله لون ازرق وبعده لون برتقالي لون ازرق وبعده لون برتقالي إلا أنه بعد إزاحة اللون رتبة واحدة نجد ان اللون الأسود لم يصبح بعده أي لون؛ أي تغير موضع الألوان اللون الأخير اصبح اللون الأول، وهذا عكس ما نجده في الألوان المتموضعة دائرياً.



من هنا لابد ان نقوم في حالة التباديل الدائرية بتثبيت أحد العناصر دون ان يتم غير مكانه وبالتالي فكل العناصر تتغير حسب هذا العنصر الثابت أي بمثابة بوصلة لتحديد التغيرات، وفي هذا المثال سنقوم بتثبيت اللون الأسود واعتباره بوصلة التغيرات



من خلال الشكل السابق نلاحظ أن لدينا 6 تبديلات وبالتالي القانون في حالة التبديلات الدائرية هو

$$p_n = (n - 1)!$$

$$p_4 = (4 - 1)!$$

$$3! = 3 \times (3 - 1) \times (3 - 2)$$

$$3! = 6$$

مع العلم ان هذه التباديل الدائرية هي حالة خاصة وهي تعتمد على طرح واحد من العدد الإجمالي وحساب العدد العاملي للباقي.

مثال: بكم طريقة يمكن ان يجلس وفد دبلوماسي مكن من 9 أشخاص في طاولة دائرية؟

بما أن الطاولة دائرية فهذا يعني أنه لا بد وأن يكون أحد افراد الوفد في مكان ثابت حتى يتمكن الأشخاص الاخرين تغيير تبديلاتهم بناء عليه.

$$p_n = (n - 1)!$$

$$p_9 = (9 - 1)!$$

$$8! = 40320$$

وبالتالي فان عدد التبديلات الممكنة هو 40320 تبديلة

التبادل مع التكرار

في بعض الحالات لا يمكن أن نفرق بين عناصر المجموعة n أي عندما كون العناصر متماثلة. في هذه الحالة يمكن معرفة عدد التباديل من خلال الصيغة العامة التالية:

$$P_n^{n_1 n_2 n_3 \dots n_k} = \frac{n!}{n_1! n_2! n_3! \dots n_k!}$$

حيث أن كل من n_1 حتى n_k تمثل العناصر المتماثلة حيث:

$$n_1 + n_2 + n_3 + \dots n_k = n$$

وحتى يتم توضيح وبرهنة هذه النظرية، نفترض أننا نريد تكوين جميع التباديل الممكنة دون النظر إلى معنى الكلمة وذلك باستخدام الحروف التالية: $WZWWG$ ، في الحالة العدية يكون عدد التباديل ممكنة لخمسة حروف ليست متكررة هو 120 بديلة تم حسابها كما يلي: $5! = 120$

مع العلم ان هذه الحروف نعتبرها ليست متكررة $W_1ZW_2W_3G$ حيث تم التفرقة بين الحروف المكررة عن طريق الترقيم $W_1W_2W_3$ فاذا تم القيام بالتبديلات التالي:

$W_1W_2W_3ZG$
 $W_1W_3W_2ZG$
 $W_2W_1W_3ZG$
 $W_2W_3W_1ZG$
 $W_3W_2W_1ZG$
 $W_3W_1W_2ZG$

نلاحظ أن هناك 6 تبديلات في حالة ما إذا فرقنا بين الحرف المكرر ثلاث مرات بالأرقام وهوناتج من حساب $3! = 6$ لكن الملاحظ هنا أنه إذا حذفنا الأرقام فأنا الست 6 تبديلات سوف تصبح تبديلة واحدة كالتالي:

$WWWZG$
 $WWWZG$
 $WWWZG$
 $WWWZG$
 $WWWZG$
 $WWWZG$

نلاحظ أن كل التبديلات عبارة عن تبديلة واحدة: أي أنه لدينا تبديلة واحدة وليس 6 ستة تبديلات لذلك حتى يتم التخلص من التكرار الذي ليس له معنى في التبديلات لابد من أن نقسم على عدد التبديلة المكررة وهنا هو 6 أي $3! = 6$ ومنه لحساب التبديلات في هذه الحالة التي فيها رقم واحد مكرر نقوم بما يلي:

$$\frac{5!}{3!} = \frac{120}{6} = 20$$

مثال 1: احسب عدد التباديل المختلفة الممكن تكوينها من الحروف التالية بغض النظر عن المعنى:

pozzozrapoana

الحل:

نلاحظ أن هناك احرف متكررة وبالتالي لا يمكن التمييز بها في عملية التبديل وتكرار الحروف

كالتالي:

حرف p متكرر مرتين $n_1 = 2$

حرف o متكرر ثلاث مرات $n_2 = 3$

حرف z متكرر ثلاث مرات $n_3 = 3$

حرف r متكرر مرة واحدة $n_4 = 1$

حرف a متكرر ثلاث مرات $n_5 = 3$

حرف n متكرر مرة واحدة $n_6 = 1$

وبالتالي يمكن تطبيق القانون التالي:

$$P_n^{n_1 n_2 n_3 \dots n_k} = \frac{n!}{n_1! n_2! n_3! \dots n_k!}$$

$$P_{13}^{2 \times 3 \times 3 \times 1 \times 3 \times 1} = \frac{13!}{2! 3! 3! 1! 3! 1!} = 1108800$$

مثال 2: اوجد عدد الطرق الممكنة لترتيب 8 كرات خمسة حمراء واثنين بيضاء وواحدة زرقاء

الحل:

بما ان هناك الوان فيها تكرارات لذلك نستخدم العلاقة التالي:

نرمز للكرات الحمراء بـ $n_1 = 5$

نرمز للكرات البيضاء بـ $n_2 = 2$

نرمز للكرات الزرقاء بـ $n_3 = 1$

وبالتالي يمكن تطبيق القانون التالي:

$$P_n^{n_1 n_2 n_3} = \frac{n!}{n_1! n_2! n_3!}$$

بالتعويض نحصل على:

$$P_8^{5 \times 2 \times 1} = \frac{8!}{5! 2! 1!} = 168$$

ومنه هناك 168 تبديلة يمكن الحصول عليها في هذه الحالة

2_ الترتيب. Les Arrangements

الترتيبات: هي وضع مرتب لمجموعة من الأشياء ليست مأخوذة جميعها؛ أي

جزء من الكل.

2_1_ التراتيب دون تكرار.

إذا كان لدينا الاحرف التالية

WSZG

وطلب منا ترتيبها اثنين اثنين بترتيبات مختلفة دون تكرار:

$\langle WS | WZ | WG \rangle$

$\langle SW | SZ | SG \rangle$

$\langle ZW | ZS | ZG \rangle$

$\langle GW | GS | GZ \rangle$

نلاحظ أننا حصلنا على 12 ترتيبية

وحتى نبين بطريقة أخرى نلاحظ الشكل التالي:

تلخيص عملية الترتيب	
في الحالة الأولى لدينا أربع حروف يمكن أن نضعها في الترتيب الأول	في الحالة الثانية لدينا فقط ثلاث اختيارات لأننا نكون قد وضعنا حرف في الحالة الأولى
4	3
وبالتالي بما أن الحروف مع بعضها أي نستخدم عملية الضرب لنجد 4×3 والنتيجة هي 12	

ويمكن حسابه من خلال القاعدة التالية:

إن ترتيب p عنصرا اختراها من بين n عنصرا وهو تشكيل مرتب لـ p من n عنصرا، حيث كل

واحد منها يظهر مرة واحدة على الأكثر في نفس الترتيب

إذا رمزنا بـ A_n^p إلى عدد الترتيبات

p عنصرا مختارا من بين n ، $p = 2$

n العدد الكلي $n = 4$

$$A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!} = A_4^2 = \frac{4!}{(4-2)!} = \frac{4!}{(2)!} = \frac{4 \times 3 \times \mathbf{2!}}{\mathbf{(2)!}} = 4 \times 3 = 12$$

ومنه عدد الترتيبات الممكنة دون تكرار هو 12

مثال: لدينا خمسة مرشحين للانتخابات الرئاسية سينتقل منهم اثنين أحدهما رئيس والأخر نائب، فما هو عدد الترتيب الممكنة.

تلخيص عملية الترتيب	
في الحالة الأولى لدينا خمسة مرشحين يمكن أن يكون أي منهم في الترتيب الأول يعني خمسة خيارات	في الحالة الثانية لدينا فقط أربع مرشحين لأننا نكون قد اخترنا مرشحا في الحالة الأولى
5	4
وبالتالي بما أن الحروف مع بعضها أي نستخدم عملية الضرب لنجد 5×4 والنتيجة هي 20	

إذا رمزنا بـ A_n^p إلى عدد الترتيبات

p عنصرا مختارا من بين n ، $p = 2$

n العدد الكلي $n = 5$

$$A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!} = A_5^2 = \frac{5!}{(5-2)!} = \frac{5!}{(3)!} = \frac{5 \times 4 \times 3!}{(3)!} = 5 \times 4 = 20$$

ومنه عدد الترتيبات الممكنة لاختيار رئيس ونائب مع ال هو 20 ترتيبية

2_1 الترتيب مع التكرار.

نقصد بالترتيب مع التكرار إمكانية اختيار عنصر p من بين العناصر المتاحة أكثر من مرة والمثال التالي يوضح ذلك:

إذا كان لدينا الأحرف التالية

WSZG

وطلب منا ترتيبها اثنين اثنين بترتيبات مختلفة مع التكرار:

$\langle WS | WZ | WG | WW \rangle$

$\langle SW | SZ | SG | SS \rangle$

$\langle ZW | ZS | ZG | ZZ \rangle$

$\langle GW | GS | GZ | GG \rangle$

نلاحظ أننا حصلنا على 16 ترتيبية

وحتى نبين بطريقة أخرى نلاحظ الشكل التالي:

تلخيص عملية الترتيب	
في الحالة الأولى لدينا أربع حروف يمكن أن نضعها في الترتيب الأول	في الحالة الثانية لدينا أيضا أربع اختيارات لأنه مسموح بتكرار الحرف الذي اختير سابقا
4	4
وبالتالي بما أن الحروف مع بعضها أي نستخدم عملية الضرب لنجد 4×4 والنتيجة هي 16	

حيث أن العملية الحسابية التي حسبنا بها هي 4×4 أي: 4^2

وبما أن

p عنصرا مختارا من بين n ، $p = 2$

n العدد الكلي $n = 4$

نرمز للترتيبات مع التكرار بالرمز $\widehat{A}_n^p = \underbrace{n \times n \times n \times n \times \dots \times n}_p = n^p$

حيث أن: n يمثل العدد الإجمالي

p يمثل العدد الذي نختاره من العدد الإجمالي لأجل ترتيبه

مثال للمقارنة:

إذا كان لدينا الأرقام التالية: 0, 1, 2, 4, 6, 8, 9، فما هي عدد الطرق التي يمكن أن نحصل بها على

ترتيبات مكونة من أربعة أرقام في حالة التكرار وفي حالة عدمه

لدينا:

p عنصرا مختارا من بين n ، $p = 4$

n العدد الكلي $n = 7$ $\{0, 1, 2, 4, 6, 8, 9\}$

في حالة عدم التكرار	في حالة التكرار
$\widehat{A}_n^p = \frac{n!}{(n-p)!} = A_7^4 = \frac{7!}{(7-4)!} = \frac{7!}{(3)!}$ $= \frac{7 \times 6 \times 5 \times 4 \times \mathbf{3!}}{\mathbf{(3)!}}$ $= 7 \times 6 \times 5 \times 4 = \mathbf{840}$	$\widehat{A}_7^4 = \underbrace{7 \times 7 \times 7 \times 7}_{p=4} = 7^4 = \mathbf{2401}$
840	2401
نلاحظ أن عدد الترتيبات في حالة التكرار أكبر منها في حالة عدم التكرار أي:	
$\widehat{A}_n^p > A_n^p$	
تتساوى الترتيبات في حالة التكرارات وعدم التكرارات إلا إذا كان $p = 1$	

3_ التوفيقات. Les Combinaisons

التوافيق هي اختيار عدد من المفردات بحجم P من مجموعة كبيرة بحجم n وبدون ترتيب ، حيث $p \leq n$ ، والمثال التالي يبين التوفيقات:

لدينا أربع كرات متجانسة وملونة بالألوان التالية: أحمر R ، أبيض B ، أزرق P ، أسود N . ونريد أن نختار اثنين من الكريات ، وبالتالي تكون الطرق الممكنة للاختيار كما يلي:

$$\text{التوفيقات الممكنة} \left\{ \begin{array}{l} NP \\ NB \\ NR \\ PB \\ PR \\ BR \end{array} \right.$$

نلاحظ أن لدينا 6 توفيقات ممكنة

ملاحظة:

التوفيقات تشبه الترتيبات لكن في هذه الحالة التشكيلتين $\{NP, PN\}$ نعتبرهما تشكيلة واحدة فمثلا عند ذلك لحل بهدف شراء قلم احمر وقلم أزرق ، نعتبر قولك لصاحب المكتبة أعطيني قلم احمر وقلم أزرق أو أعطيني قلم أزرق وقلم أحمر نفس الشيء.

تعريف: إن توافقية عنصر P اخترناه من بين N عنصرا هي تشكيل غير مرتب لهذه العناصر حيث يظهر كل واحد منها مرة واحدة على الأكثر.

نرمز بـ C_n^P وأحيانا $\binom{n}{p}$ إلى عدد التوفيقات الممكن إجراءها بواسطة p عنصرا نختاره من بين n حيث أن $p \leq n$

$$C_n^P = \frac{n!}{p! (n - p)!}$$

بالعودة إلى المثال السابق: لدينا أربع كرات متجانسة وملونة بالألوان التالية: أحمر R ، أبيض B ، أزرق P ، أسود N . ونريد أن نختار اثنين من الكريات، وبالتالي تكون الطرق الممكنة للاختيار كما يلي:


في هذه الحالة $P = 2$ و $n = 4$

$$C_n^P = \frac{n!}{p!(n-p)!} \text{ أي } C_4^2 = \frac{4!}{2!(4-2)!} = \frac{4 \times 3 \times 2!}{2! 2!} = \frac{12}{2} = 6$$

الفرق بين التوفيقية والترتيبية هو أن الترتيبية يكون للترتيب فيها معنى أي يؤثر على **المشاهدة** مثلاً: إذا كانت لدينا الأرقام التالية: $(1, 2, 3, 4, 5)$ وطلب منا تشكيلها اثنين اثنين دون تكرار فإننا نجد فرق بين ترتيب رقمين مثلاً $(12|21)$ الأولى تُقرأ اثني عشر والأخرى تُقرأ واحد وعشرون، أما إذا كانت لدينا مثلاً أربع كرات ملونة واحدة حمراء والخرى بيضاء والأخرى زرقاء والأخيرة سوداء وطلب منا تشكيلها اثنين اثنين ووضعنا ترتيب $(\text{زرقاء حمراء} | \text{حمراء زرقاء})$ من هنا نلاحظ أن التغيير في الترتيب ليس له أي معنى وبالتالي تعتبر تشكيلة واحدة،

ملاحظة:

الفرق بين التوفيقية والترتيبية هو أن الترتيبية يكون للترتيب فيها معنى أي يؤثر على المشاهدة مثلاً: إذا كانت لدينا الأرقام التالية: $(1, 2, 3, 4, 5)$ وطلب منا تشكيلها اثنين اثنين دون تكرار فإننا نجد فرق بين ترتيب رقمين مثلاً $(12|21)$ الأولى تُقرأ اثني عشر والأخرى تُقرأ واحد وعشرون، أما إذا كانت لدينا مثلاً أربع كرات ملونة واحدة حمراء والخرى بيضاء والأخرى زرقاء والأخيرة سوداء وطلب منا تشكيلها اثنين اثنين ووضعنا ترتيب $(\text{زرقاء حمراء} | \text{حمراء زرقاء})$ من هنا نلاحظ أن التغيير في الترتيب ليس له أي معنى وبالتالي تعتبر تشكيلة واحدة،



توضيح الفرق في القانون بين الترتيب والتوفيقه

توفيقه

$$C_n^p = \frac{n!}{p! (n - p)!}$$

ترتيب

$$A_n^p = \frac{n!}{(n - p)!}$$

الفرق بين الترتيب والتوفيقه في القانون هو أننا في التوفيقه نقسم على

$$p! (n - p)!$$

والهدف من إضافة $p!$ هو إلغاء الترتيب لأنه كما شرحنا سابقا فان الترتيب ليس له معنى وبالتالي التشكيلات التي تغير فيها الترتيب تحسب واحدة فقط لاد من الغائها بالقسمه على $p!$

خصائص التوفيقات:

الخاصية الأولى:

إذا كان الفرق بين العدد الكلي n والعدد المسحوب واحد $(n-1)$ فإن عدد التوفيقات يساوي العدد الكلي n

$$C_n^{n-1} = \frac{n!}{(n-1)!(n-(n-1))!} = \frac{n \times (n-1)!}{(n-1)!(n-n+1)!} = \frac{n}{(0+1)!} = n$$

الخاصية الثانية:

إذا كان العدد الكلي والعدد المسحوب متساوي فإن عدد التوفيقات يكون مساوي للعدد واحد

$$C_n^n = \frac{n!}{(n)!(n-(n))!} = \frac{(n)!}{(n)!(0)!} = \frac{(n)!}{(n)!} = 1$$

الخاصية الثالثة:

إذا كان العدد المسحوب هو صفر من العدد الكلي n فإن عدد التوفيقات يكون توفيقا واحدة 1

$$C_n^0 = \frac{n!}{(0)!(n-0)!} = \frac{(n)!}{(n)!} = \frac{(n)!}{(n)!} = 1$$

الخاصية الرابعة:

إذا كان العدد المسحوب هو 1 من العدد الكلي n فإن عدد التوفيقات يكون مساوي للعدد الكلي n

$$C_n^1 = \frac{n!}{1!(n-1)!} = \frac{n(n-1)!}{(n-1)!} = n$$

في هذه الحالة فإن: $C_n^1 = A_n^1$

مثال في خواص التوفيقات:

$$C_n^1 = n \quad \text{مثال} \quad \begin{matrix} C_5^1 = 5 \\ C_{10}^1 = 10 \\ C_{66}^1 = 66 \end{matrix}$$

$$C_n^0 = 1 \quad \text{مثال} \quad \begin{matrix} C_9^0 = 1 \\ C_{11}^0 = 1 \\ C_{88}^0 = 1 \end{matrix}$$

$$C_n^{n-1} = n \quad \text{مثال} \quad \begin{matrix} C_6^5 = 6 \\ C_{99}^{98} = 99 \\ C_{46}^{45} = 46 \end{matrix}$$

$$C_n^n = 1 \quad \text{مثال} \quad \begin{matrix} C_9^9 = 1 \\ C_{111}^{111} = 1 \\ C_{40}^{40} = 1 \end{matrix}$$

المصدر الاول للطالب الجزائري



إذا أخذنا مرشحين اثنين من بين ثلاثة مرشحين ولم نأخذ بعين الاعتبار الترتيب. فما هي عدد التوفيقات الممكنة واذكرها؟

$$P = 2 \rightarrow \text{المسحوب}$$

$$n = 3 \rightarrow \text{الكلي العدد}$$

$$C_n^P = C_3^2 = \frac{3 \times 2!}{2! (3 - 2)!} = 3$$

مثال:

اراد مدرب فريق كرة القدم تشكيل فريق من 11 لاعب، يتم اختيارهم من بين 20 لاعب. فما هو عدد الفرق التي يمكن تشكيلها؟

$$P = 11 \rightarrow \text{المسحوب}$$

$$n = 20 \rightarrow \text{الكلي العدد}$$

$$C_n^P = C_{20}^{11} = \frac{20 \times 19 \times 18 \times 17 \times 16 \times 15 \times 14 \times 13 \times 12 \times 11!}{11!(20 - 11)!} = 167960$$

أن المدرب له خيارات عديدة لتشكيل الفريق وهي 167960 امكانية.

2. المعاينة (العينات المرتبة): هي عدد العينات المكونة من r عنصر التي يمكن اختيارها من مجتمع يحتوي على n عنصرو يكون ذلك بطريقتين هما:

1. 2 العينات مع الاحلال (الاعادة او الارجاع): أن عدد العينات التي يمكن تشكيلها عن طريق الاختيار السحب) بالإحلال (الاعادة تساوي n^p . ان الفرد الأول يتوفر على n امكانية لاختياره وبالمثل بالنسبة للفرد الثاني، لأننا اعدنا الفرد الأول للمجتمع، وهكذا يتم اختيار الفرد تلو الآخر حتى نصل إلى العنصر من العينة الذي له نفس امكانيات العناصر السابقة له. وبالتالي فان عدد العينات المشكلة هذه الطريقة تساوي:

$$n \times n \times n \times n \dots n = n^p$$

مثال:

لدينا أوراق الكوتشينية التي تحوي 52 ورقة، بكم طريقة يمكن اختيار أربعة أوراق الكوتشينية مع الإعادة،

$$52 \times 52 \times 52 \times 52 = 52^4 = 7311616$$

عينة مرتبة مختلفة حجمها 7311616 بالاحلال (الاعادة).

2. 2 العينات بدون احلال (بدون اعادة او بدون ارجاع): أما عدد العينات التي يمكن تشكيلها عن طريق السحب بدون احلال (اعادة) هو A_n^p . أن الفرد الأول يتوفر على امكانية لسحبه، أما الفرد الثاني فيكون على $(n - 1)$ لأننا لم نرجع الفرد الأول للمجتمع، وهكذا يتم سحب الفرد تلو الآخر حتى نصل الى العنصر p من العينة الذي له $(n - p + 1)$ امكانية. وبالتالي فان عدد العينات المشكلة هذه الطريقة تساوي:

$$n \times (n - 1) \times \dots \times (n - r + 1) = A_n^P$$

مثال:

لدينا أوراق الكوتشينية التي تحوي 52 ورقة، بكم طريقة يمكن اختيار أربعة أوراق الكوتشينية بدون
ارجاع؟

$$= 52 \times 51 \times 50 \times 49 = 6497400 \quad 52! / 48! = 52 \times 51 \times 50 \times 49 = 6497400$$

عينة مرتبة مختلفة حجمها 3 بدون ارجاع.

SAHLA MAHLA

المصدر الأول للطالب الجزائري



القسم الثاني: أساسيات الاحتمال

أولاً: تعاريف ومفاهيم أساسية في نظرية الاحتمالات

1. التجربة

التجربة هي كل عملية تؤدي إلى ملاحظة أو قياس، وتنقسم إلى قسمين:

التجربة النظامية

التجربة النظامية هي كل تجربة نحدد نتائجها مسبقاً على أساس القوانين العلمية المعروفة، وذلك انطلاقاً من جملة من الشروط المرتبطة بالظاهرة والمتوفرة أثناء التجربة (المقدمات). حيث نجد أن هذا النوع من التجارب في مجال العلوم الدقيقة، وبصورة أساسية في مجال الفيزياء والكيمياء.

التجربة العشوائية

التجربة العشوائية هي كل تجربة تكون نتائجها غير معروفة مسبقاً، وإذا كررنا نفس التجربة وظمن نفس الشروط (نفس المقدمات) فإننا لا نحصل بالضرورة على نفس النتائج.

مثال:

لتكن التجربة العشوائية التالية: نرمي زهرة نرد متجانسة (ليست مزورة: المزورة هي الزهرة التي لا تكون نفس الحظوظ لكل رقم بالظهور) مرة واحدة، وبطريقة عشوائية:

س: ما هو احتمال ظهور الرقم 6؟

من خلال هذه التجربة نحدد ما يلي:

- أداة التجربة: زهرة النرد

- طريقة التجربة: رمي زهرة النرد مرة واحدة

- هذه التجربة هي تجربة عشوائية لأننا لا نعرف النتيجة مسبقاً، وفي حالة تكرار هذه التجربة

فإننا لن نحصل بالضرورة على نفس النتيجة، وبالتالي الإجابة على السؤال ستكون حساب

النسبة المحتملة لظهور الرقم 6.

2- مجموعة الأساس: هي مجموعة النتائج الممكنة والمختلفة لتجربة ما، ونرمز لها بالرمز E وتعرض

على شكل مجموعة رياضية $E = \{ \dots \dots \dots \}$ ، وعدد عناصرها E ، ونرمز لها بالرمز $|E|$

مثال:

لدينا: $E = \{PF\}$ أي أن، $|E| = 2$

ملاحظة: نحدد مجموعة الأساس من خلال الأداة وطريقة التجربة العشوائية

تعريف ومبادئ أولية:

كثيرا ما نستعمل هذه الكلمة التي تجري على لسان العديد من الناس فمثلا في الانتخابات نقول ان شخص معين محتمل ان ينجح، او عندما نشارك في مسابقة ويكون عدد المشاركين كبير نقول ان احتمال النجاح صغير وعندما يكون عدد المشاركين قليل نقول ان نسبة النجاح مرتفعة وان هناك حظ أوفر، واحيانا اذا كان عدد المناصب وعدد المشاركين متساوي فاننا نقول بان نسبة النجاح هي 100 % وهذا يجعل مصطلح الاحتمال ليس من المصطلحات الغريبة بل هي كثيرة الشيع بين العامة وبين الاكاديميين،

تغير كثيرا تعريف الاحتمال من التعريف الكلاسيكي إلى الصورة المجردة للتعريف حسب تطور علم الاحتمالات كالتالي:

أ. التعريف الكلاسيكي للاحتمال definition Classical

نفترض أن A حدث في فراغ S ، وأن عددي عناصر A و S هما n و N

. ويتم حساب الاحتمال حسب تعريف باسكال للاحتمال:

عرف بليز باسكال (1623 : Blaise Pascal) الاحتمال بالشكل التالي :

"احتمال حدث هو عدد الحالات الملائمة لوقوع الحدث مقسوما على عدد الحالات الممكنة، إذا اقتضينا أن كل الحالات لها نفس الاحتمال في الوقوع."

نعرف احتمال الحدث A كما يلي: $P(A)$ على أنه $P(A) = \frac{n}{N}$

مثال: عند رمي زهرة نرد مرة واحدة فإن الحادث A يعني ظهور رقم فردي يعني أن الناتج 1 أو 3 أو 5

$$S = \{1. 2. 3. 4. 5. 6. \}$$

$$A = \{1. 3. 5. \}$$

$$n = 3 \quad N = 6$$

احتمال الحصول على رقم فردي

$$P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

وهذا يعني نظريا أنه إذا كررنا التجربة عددا كبيرا جدا من المرات فإن حدوث A يشكل نصف المرات. بالطبع إذا رمينا الزهر 100 مرة فلن نحصل بالضبط على نصف هذا العدد من A , فنسبة حدوث A تتغير كلما اعدنا الرمي 100 مرة. الأمر الذي سيتم التطرق له في التعريف الثاني

مثال: في تجربة رمي زهرتي نرد أوجد الاحتمالات التالية:

- A. مجموع رقمي الزهرتين يساوي 4
- B. مجموع الناتج يساوي 10 على الأقل
- C. ان يظهر الرقم 6 في زهرة النرد الثانية
- D. مجموع الرقمين الظاهرين أكبر من 5
- E. ناتج أحد الزهرين هو 6
- F. مجموع الناتجين أقل من 6

الحل

اول ما نقوم به هو تحديد عدد الحالات الكلية N ، بما انه لدينا زهرتي نرد كل زهرة تحمل ستة أرقام ونحن نقول

ظهور الرقم الاول الخاص بزهرة النرد الاولى و الرقم الثاني الخاص بزهرة النرد الثانية

قلنا سابقا أن حرف **الواو** رياضيا يقابه عملية الضرب


وبما ان عدد الحالات في زهرة النرد الاولى هو ستة نفسه في زهرة النرد الثانية

$$6 \times 6 = 36$$

$$N = 36$$

ايضا يمكن تحديد الحالات الكلية كالتالي:

زهرة النرد الثانية	زهرة النرد الاولى					
	1	2	3	4	5	6
1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6
2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6
4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6
5	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6
6	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6



من خلال الجدول السابق نلاحظ أن عدد الحالات الكلية هو $N = 36$

حل السؤال الاول: مجموع رقمي الزهرتين يساوي 4

أولاً: فراغ العينة الذي يحدد الحالات الكلية S

$$S = \{(1.1)(1.2)(1.3)(1.4)(1.5)(1.6)(2.1)(2.2)(2.3)(2.4)(2.5)(2.6)(3.1)(3.2)(3.3)(3.4)(3.5)(3.6)(4.1)(4.2)(4.3)(4.4)(4.5)(4.6)(5.1)(5.2)(5.3)(5.4)(5.5)(5.6)(6.1)(6.2)(6.3)(6.4)(6.5)(6.6)\}$$

عدد الحالات الكلية كما قلنا سابقاً هو 36

ثانياً: فراغ العينة الذي يحدد الحالات الممكنة A الذي يحقق شرط مجموع الرقمين الظاهريين يساوي 4

$$A = \{(1.3)(2.2)(3.1)\}$$

نلاحظ أن عدد الحالات التي يكون فيها مجموع الرقمين الظاهريين هو 4 يمثل ثلاث حالات فقط ومنه احتمال حدوث الحادث A هو

$$P(A) = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}$$

حل السؤال الثاني: مجموع الناتج يساوي 10 على الأقل

معنى ان يكون المجموع 10 على الأقل هو ان يكون مجموع الرقمين الظاهريين لزهرتي النرد إما 10 أو 11 أو 12

هنا نستفسر لماذا توقفنا عند رقم 12

الجواب لان أكبر مجموع يمكن الحصول عليه من جمع الرقمين الظاهريين

لزهرتي النرد هو ناتج عن مجموع اكبر رقمين واكبر رقمين هم $12 = 6 + 6$

أما أقل مجموع فهو ناتج عن مجموع اقل رقمين أي $2 = 1 + 1$

$$B = \{(4.6)(6.4)(5.5)(5.6)(6.5)(6.6)\}$$

نلاحظ أن عدد الحالات التي يكون فيها يكون المجموع 10 على الأقل هو 6 حالات ومنه احتمال

حدوث الحادث B هو

$$P(B) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

حل السؤال الثالث: ان يظهر الرقم 6 في زهرة النرد الثانية

فراغ العينة C الذي يحقق شرط ظهور الرقم 6 في زهرة النرد الثانية هو:

$$C = \{(1, 6)(2, 6)(3, 6)(4, 6)(5, 6)(6, 6)\}$$

نلاحظ أن عدد الحالات التي يظهر فيها الرقم 6 في زهرة النرد الثانية هو 6 حالات ومنه احتمال حدوث الحادث C هو

$$P(C) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

حل السؤال الرابع: الحادث D مجموع الرقمين الظاهرين أكبر من 5

معنى ان يكون المجموع أكبر من 5 هو أن يكون مجموع الرقمين الظاهرين لزهرتي النرد إما 6 أو 7 أو 8 أو 9 أو 10 أو 11 أو 12

نحن نعلم أن اقل مجموع يمكن الحصول عليه هو 2 وأكبر مجموع يمكن الحصول عليه هو 12 نلخص ذلك كما يلي:

مجموع الرقمين الظاهرين أكبر من 5						مجموع الرقمين الظاهرين 5 وأقل				
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
(6, 6)	(5, 6) (6, 5)	(4, 6) (5, 5) (6, 4)	(3, 6) (4, 5) (5, 4) (6, 3)	(2, 6) (3, 5) (4, 4) (5, 3) (6, 2)	(1, 6) (2, 5) (3, 4) (4, 3) (5, 2) (6, 1)	(1, 5) (2, 4) (3, 3) (4, 2) (5, 1)	(1, 4) (2, 3) (4, 1)	(1, 3) (2, 2) (3, 1)	(1, 2) (2, 1)	(1, 1)

نلاحظ أن عدد الحالات التي يكون فيها المجموع أكبر من 5 هو 27 حالة ومنه احتمال حدوث الحادث D هو:

$$P(D) = \frac{27}{36}$$

حل السؤال الخامس: الحادث E ناتج أحد الزهرين هو 6

$$E = \{(1, 6)(2, 6)(3, 6)(4, 6)(5, 6)(6, 6)(6, 1)(6, 2)(6, 3)(6, 4)(6, 5)\}$$

نلاحظ أن عدد الحالات التي يظهر فيها الرقم 6 هو 11 حالات ومنه احتمال حدوث الحادث E هو

$$\{25\}$$

$$P(E) = \frac{11}{36}$$

حل السؤال السادس: الحادث F مجموع الناتجين أقل من 6

معنى ان يكون المجموع أقل من 6 هو أن يكون مجموع الرقمين الظاهرين لزهرتي النرد إما 5 أو 4 أو 3 أو 2

نحن نعلم أن أقل مجموع يمكن الحصول عليه هو 2 وأكبر مجموع يمكن الحصول عليه هو 12 نلخص ذلك كما يلي:

مجموع الرقمين الظاهرين أكبر من 5						مجموع الرقمين الظاهرين أقل من 6				
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
(6.6)	(5.6)	(4.6)	(3.6)	(2.6)	(1.6)	(1.5)	(1.4)	(1.3)	(1.2)	(1.1)
	(6.5)	(5.5)	(4.5)	(3.5)	(2.5)	(2.4)	(2.3)	(2.2)	(2.1)	
		(6.4)	(5.4)	(4.4)	(3.4)	(3.3)	(4.1)	(3.1)		
			(6.3)	(5.3)	(4.3)	(4.2)				
				(6.2)	(5.2)	(5.1)				
					(6.1)					

نلاحظ أن عدد الحالات التي يكون فيها المجموع أقل من 6 هو 9 حالات ومنه احتمال حدوث الحادث F هو:

$$P(F) = \frac{9}{36}$$

ب. التعريف التكراري للاحتمال **Frequencial definition**

نفرض أننا بدأنا برمي الزهر 100 مرة وحسبنا نسبة A ، ثم أكملنا عدد الرميات إلى 200 وحسبنا نسبة A ، ثم أكملنا عدد الرميات إلى 500 وحسبنا نسبة A ، وهكذا، فاننا سنجد أن النسبة تتغير كل مرة إلا أنه مع استمرار الزيادة في عدد التجارب فإن النسبة ستقترب من النسبة النظرية.

ج. التعريف الاعتقادي للاحتمال **Degree of belief**

مع تقدم الزمن وجد أن التعريفين السابقين لا يحققان كل التجارب، فظهر تعريف الاحتمال بأنه مستوى الاعتقاد، فهناك تجارب لا يعرف فيها عدد عناصر الفراغ أو الحدث. مثلاً إذا أردنا ان نحدد احتمال الفوز لكل فريق في مقابلة كرة القدم، في هذه الحالة ليس لدينا فراغ بالمفهوم السابق حتى

نحسب عدد العناصر وبالتالي عدم امكانية عد عناصر الحدث، كما أنه ليس من الممكن تكرار التجربة (لا يمكن تكرار المبارات في نفس الظروف عدة مرات) حتى نستطيع استخدام التعريف الاجرائي، وبالتالي في هذه الحالة يمكن لأي شخص أن يفكر في إحتمال للحدث حسب رؤيته الشخصية والمعطيات التي يتوفر عليها، وبالتالي هذا النوع من الاحتمال سمي بالاحتمال الاعتقادي.

ج. التعريف التجريدي للاحتمال Axiomatic definition

في هذا التعريف لا نشير إلى موضوع محدد ولكن نتحدث عن قانون يمثل الاحتمال في تجربة ما: أي دالة حقيقية تحقق الشروط الآتية تسمى دالة احتمال؛ بمعنى أنها وصف حدث ما في تجربة ما:

$$\begin{cases} \text{I} & f(x) \geq 0 & x \in S \\ \text{II} & f(x) = 1 \\ \text{III} & f\left(\bigcup_C A_j\right) = \sum_i f(A_j) \end{cases}$$

سيتم التفصيل في هذا النوع من الاحتمالات في الاقسام القادمة

خصائص الإحتمال

عادة ما نعبر عن هذه الخصائص بالطريقة التالية:

- الاحتمال هو عدد موجب تماما أو معدوم (لا يكون سالبا).
- مجموع احتمالات أحداث تجربة ما يساوي الواحد.
- ويمكن إضافة خاصية ثالثة تستنتج بديهيا من الخاصيتين السالفتين وهي أن الاحتمال يكون محصورا بين 0 و 1. أي أنه لا يمكن أن يكون سالبا ولا أن يكون أكبر من الواحد.

الأركان الخمسة في حساب الاحتمالات

هناك خمس قواعد أساسية في حساب الاحتمال نذكرها الآن باقتضاب لإبراز أهميتها ونعود لشرحها فيما بعد وسنحتاج إلى استخدام هذه القواعد في جميع فصول المقياس.

1. احتمال وقوع حدث يساوي 1 مطروحا منه احتمال الحدث المعاكس. مجموع احتمال الحدث واحتمال الحدث المعاكس يساوي 1.

2. احتمال وقوع حدثان "أ" و "ب" يساوي احتمال وقوع الأول مضروباً في احتمال وقوع الثاني لما يكون الأول قد وقع فعلاً.
3. احتمال وقوع حدثان مستقلان يساوي جداء الاحتمالين أي احتمال الحدث الأول مضروباً في احتمال الحدث الثاني.
4. احتمال وقوع الحدث وعكسه يساوي الصفر، ونقول أن الحدثان متنافيان.
- 5 احتمال وقوع حدث "" أو "ب" يساوي جمع احتمالي الحدثين مطروحاً منه احتمال تحققهما معاً.

هنا فرق بين الحدث والاحتمال، فالحدث العشوائي هو واقعة أو نتيجة ما، أما الاحتمال فهو عدد بين الصفر والواحد يعبر عن حظوظ وقوع الحدث (ليس شرطاً أن يكون زمن وقوع الحدث هو المستقبل، فقد يكون الماضي أو الحاضر). سئل الرئيس العراقي السابق - قبل حرب الخليج الأولى - ما هو احتمال انهزامكم في هذه الحرب ؟ فأجاب: "واحد إلى مليون". عندما نرغب في التعبير بشكل دقيق على مدى إمكانية وقوع حدث معين فإننا عادة نستعمل عبارات مثل: 100% للحدث المؤكد أو 50% للحدث المحتمل و 1% مثلاً للحدث المستبعد، إذن نحن نستخدم الكسور في سلم تصاعدي من 0 إلى 1، بحيث يرمز 0 للاستحالة و 1 للتأكد.

ويجب التمييز بين الاحتمال والإمكانية (الإمكانية هي حدث). فالاحتمال في مفهوم العلم هو عدد يقيس حظوظ وقوع شيء ما نسميه نتيجة أو حدث أو إمكانية. أما الإمكانية فهي حدث أو نتيجة ما من بين أحداث أو نتائج أخرى. يختلف عن هذا المفهوم العلمي تعريف الناس للاحتمال. فكثيراً ما تطلق كلمة الاحتمال ويقصد بها إمكانية، فيقال مثلاً "إن هذا احتمال ممكن" والصحيح إن هذه إمكانية واردة "أوقال" إذا رمينا حجر نرد هناك 6 احتمالات "والصحيح" هناك 6 إمكانيات أو 6 نتائج محتملة"،

3- الحدث EVENT:

عند إجراء تجربة عشوائية يمكن أن يكون اهتمامنا موجهاً إلى نتيجة ما محددة من النتائج الممكنة للتجربة، أو إلى عدة نتائج محددة للتجربة؛ أي نهتم بالحصول على عناصر محددة من فضاء التجربة،

فعلى سبيل المثال إذا كانت لدينا حادثة A تتمثل في ظهور الصورة خلال تجربة رمي قطعة النقود مرة واحدة فإن A يمكن كتابتها كما يلي $A = \{H\}$ ، وإذا كانت الحادثة A تتمثل في ظهور الصورة مرة واحدة، في تجربة رمي قطعتي النقود فإن A تعرف كما يلي: $A = \{HT, TH\}$

فمثلاً إذا كانت الحادثة A تمثل الأعداد الفردية في تجربة رمي حجر النرد مرة واحدة فإن:

$$A = \{1, 3, 5\}$$

وإذا كانت الحادثة A هي: $A = \{(X, Y): X + Y < 4\}$ في تجربة رمي زهرتي نرد فإن:

$$A = \{(1, 1)(1, 2)(2, 1)\}$$

أنواع الحوادث:

تتمثل أنواع الحوادث كما يلي:

أ- الحدث البسيط: نقول عن حدث أنه بسيط إذا كان غير قابل للتجزئة، كظهور الرقم 2 في رمي

$$A = \{2\}$$

ب- الحدث المركب: نقول عن حدث أنه مركب إذا كان قابلاً للتجزئة، أي إمكانية تفكيكه إلى حوادث

أبسط، مثل ظهور رقم فردي في رمي زهرة النرد مرة واحدة، في هذه الحالة نكون بصدد حدث مركب من ثلاث حوادث بسيطة $A = \{1, 3, 5\}$ ، فالحصول على 1 أو 3 أو 5 يعني حتما تحقيق الحدث المركب.

وتعرف أيضا على أنها مجموعة مكونة من أكثر من نقطة من فراغ العينة. فاتحاد حوادث بسيطة هو عبارة عن حوادث مركبة، مثلا عند رمي قطعة النقود ثلاث مرات فنحن هنا امام حادث مركب من حوادث بسيطة.

ت- الحدث الأكيد: نقول عن حدث أنه أكيد إذا كان يحوي جميع الأحداث البسيطة المرتبطة بالتجربة، مثل الحصول على رقم أقل من 9 في تجربة رمي قطعة نرد مرة واحدة، $E = A$.

ث- الحدث المستحيل: نقول عن حدث أنه مستحيل إذا كان غير قابل للتحقق، أي لا يتضمن ولا حدث بسيط، مثل الحصول على رقم 10 في تجربة رمي قطعة نرد مرة واحدة، $A = \emptyset$.

ج- الحوادث المتنافية «exclusive events»: الحوادث المتنافية هي الحوادث التي لا يمكن وقوعها في آن واحد، لان وقوع أحدها يمنع من وقوع الحوادث الأخرى، الأمر الذي يعني عدم وجود عناصر مشتركة للعناصر المكونة لها،

مثال: لو تناولنا سلة فيها تفاح أحمر وباذنجان مثلا، وسألنا عن احتمال الحصول على حبة خضار لونها أحمر لدى سحب الحبة من الحبات الموجودة في السلة، لاتانا الجواب بان هذا الحدث حدث مستحيل لا يتحقق داخل السلة المفترضة. إلا أن ما يهمنا في الواقع ليس هذا بل كونه مؤلفا من حدثين متنافيين لا اشتراك بينهما، الأول (A) حبة الخضار، والثاني (B) حبة لونها أحمر، ومن الواضح انه لا اشتراك داخل السلة بين هذين الحدثين،

و أيضا عند رمي قطعة نقود متزنة فإن ظهور الصورة ينفي ظهور الكتابة وبالتالي فإن ظهور الكتابة متعلق بعدم ظهور الصورة أي ان الحدثين متنافين.

ح- الحوادث غير المتنافية «compatible events»: الحوادث غير المتنافية هي الحوادث التي يكون وقوع أحدها غير مانع من وقوع الحوادث الأخرى، الأمر الذي يعني وجود عناصر مشتركة للعناصر المكونة لها، ويكون وقوعهما معا غير مستحيل.

مثال: ولوبقيننا في المثال المتقدم للسلة التي تحتوي على التفاح الأحمر وعلى الباذنجان، وسألنا عن احتمال الحصول على حبة فاكهة لونها أحمر لدى سحبنا لحبة من الحبات الموجودة في السلة، لكان الجواب بأنه حدث ممكن التحقق لانه مؤلف من حدثين بينهما اشتراك داخل السلة المفترضة، الأول (A) حبة الفاكهة، والثاني (B) حبة لونها أحمر، حيث يجتمعان داخل السلة المذكورة في حبة التفاح الحمراء.

خ- الحدث المتمم: الحدثان المتتامان هما اللذان يقع أحدهما إذا وفقط لم يقع الآخر؛ أي يكون يكون الحدثان A و B متتامان إذا وفقط إذا كان:

$$A \cup B = S. \quad A \cap B = \emptyset$$

$$B = S - A = \bar{A} \quad \text{أي:}$$

مثال: في تجربة رمي زهرة نرد نهتم بطبيعة الحال بالرقم الظاهر على الوجه العلوي وبالتالي فضاء العينة كالتالي:

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

فإذا كانت الأحداث A, B, C تتمثل فيما يلي:

$$A = \{1, 3, 5\}$$

$$B = \{2, 4, 6\}$$

$$C = \{2, 4\}$$

نلاحظ أن الحدثين A, B متنافيان لأن $A \cap B = \emptyset$

كما نلاحظ أن الحدثين A, B متتامان لأن $A \cup B = S$ أي أن اتحاد كل من A, B ينتج




$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

أما بالنسبة للحدثين A, C فنلاحظ أنهما متنافيان لأن $A \cap C = \emptyset$

إلا أن الحدثين A, C ليسا متتامان لأن $A \cup C \neq S$

ملاحظة مهمة

ليس كل حدثان متنافيان متتامان



SAHLA MAHLA

د- الحوادث غير المستقلة: نقول أن A و B حدثين غير مستقلين إذا كان تحقق أحدهما (مثلاً B) مرتبطاً بأي شكل من الأشكال (مشروط) بتحقيق الآخر (مثلاً A)، مثلاً السحب من مجتمع محدود وصغير مع عدم الإعادة، وبالتالي فالسحبة الموالية تتأثر بالسحبة السابقة.

ط- الحوادث المستقلة: نقول أن A و B حدثان مستقلان إذا كان تحقق أحدهما غير مرتبط بأي شكل من الأشكال (غير مشروط) بتحقيق الآخر، مثلاً السحب من مجتمع محدود وصغير مع الإعادة، وبالتالي فالسحبة الموالية لا تتأثر بالسحبة السابقة.

وبصفة رياضية فإنه إذا الحادثين E_1 و E_2 مستقلين إذا كان:

$$P(E_1 \cap E_2) = P(E_1)P(E_2)$$

نظرية:

إذا كان لديك $E_1 ; E_2$ حادثين مستقلين في Ω وكان:
أ) $E_2 ; E_1$ مستقلان, ب) $E_2 ; \bar{E}_1$ مستقلان, $\bar{E}_2 ; \bar{E}_1$ مستقلان.

مثال:

إذا كان لديك $E_1 ; E_2$ حادثين مستقلين:

$$P(E_1) = 0.3 \quad P(E_2) = 0.4$$

أحسب ما يلي:

a) $P(E_1 \cap E_2)$

b) $P(\bar{E}_1 \cap \bar{E}_2)$

c) $P(\bar{E}_1 \cap E_2)$

c) $P(\bar{E}_1 \cup E_2)$

الحل

a) $P(E_1 \cap E_2) = P(E_1)P(E_2) = (0.3)(0.4) = 0.12$

b) $P(\bar{E}_1 \cap \bar{E}_2) = P(\bar{E}_1)P(\bar{E}_2) = (0.7)(0.6) = 0.42$

c) $P(\bar{E}_1 \cap E_2) = P(\bar{E}_1)P(E_2) = (0.7)(0.4) = 0.28$

c) $P(\bar{E}_1 \cup E_2) = P(\bar{E}_1) + P(E_2) - P(\bar{E}_1 \cap E_2)$
 $= (0.7) + (0.4) - 0.28 = 0.82$



مثال

شركة موباييل اكسبلوريشن هذه الشركة عبارة عن فرع تابع لشركة موباييل ويظطلع هذا الفرع بمسؤولية اكتشاف البترول والغاز الطبيعي في أنحاء العالم تقوم الشركة باجراء مسوحات جيولوجية خلال مرحلة الاكتشاف والتي

تقدم معلومات عن باطن الأرض ثم اعتمادا على الخبرة السابقة تعرف الشركة ما إذا كانت قراءات مسوحاتها تنم عن وجود النفط أو الغاز ، ومع ذلك فإن القراءات ليست مؤشرات مثالية، لنفترض أن الشركة تقوم بعمل استكشافي في شرق استراليا، يمكن التعبير عن النتائج الممكنة للمسوحات كما يلي:

e_1 مرغوب، e_2 مرغوب،

إذا قررت الشركة التنقيب فإن النتائج ستكون كما يلي:

e_3 وجود النفط والغاز، e_4 بئر جاف،

يمكننا هنا القول أن أحداث المسوحات ليست متنافية مع حدث التنقيب لأن المسح هنا قراراته غير مثالية فقد يكون غير مرفوب وعند الحفر نجد النفط والغاز.

القوانين الاساسية في الاحتمال


جمع الاحتمالات:

أولا: حالة الاحداث المتنافية: إذا كان A و B حدثين متنافيين؛ أي أن حدوث حدث ينفي أو يمنع حدوث الحدث الآخر فإن احتمال حدوث أحدهما A أو B يساوي حاصل جمع احتمالهما أي أن:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

$$P(A \cap B) = \emptyset$$

وهذا القانون يسمى قانون الجمع



ويمكن تعميم هذا القانون كما يلي في حالة الأحداث المتنافية

لدينا $A_1, A_2, A_3, A_4, \dots, A_n$ حوادث متنافية في فضاء العينة S

$$P(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) + \dots + P(A_n)$$

مثال:

صندوق يحتوي على 12 كرة منها 7 كريات سوداء، و3 بيضاء، سحبت من الصندوق كرة واحدة عشوائياً (أ) أحسب احتمال أن تكون الكرة المسحوبة من اللون الأسود أو من اللون الأبيض،


مثال:

قبل البدء في الحل لابد من معرفة هل الحادثين متنافيين أم لا

نفرض أن حادث سحب كرة من اللون الأسود هي A

نفرض أن حادث سحب كرة من اللون الأبيض هي B

حسب تعريف الاحداث المتنافية نلاحظ أن سحب الكرة البيضاء لا يتاثر بسحب الكرة السوداء وأنهما ينفيان بعضهما أي إذا كانت الكرة المسحوبة بيضاء فهذا يعني سحب الكرة السوداء والعكس



وبما أن الاحداث متنافية فان احتمال سحب كرة بيضاء أو كرة سوداء هو كالتالي:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

وبما أننا في سحب للكريات ووفي سحب عشوائي فإننا في هذه الحالة أمام توفيقية وقد تم التطرق لها سابقا

$$\text{الاحتمال} = \frac{\text{عدد الحالات الملائمة}}{\text{عدد الحالات الكلية}}$$

- احتمال سحب كرة من اللون الأسود هي A مع العلم أن العدد الاجمالي للكرات 12 وعدد الكرات السوداء هو 7

$$P(A) = \frac{C_7^1}{C_{12}^1} = \frac{7}{12}$$

عدد الحالات الملائمة C_7^1
عدد الحالات الكلية C_{12}^1

- احتمال سحب كرة من اللون الأبيض هي B مع العلم أن العدد الاجمالي للكرات 12 وعدد الكرات البيضاء هو 3

$$P(B) = \frac{C_3^1}{C_{12}^1} = \frac{3}{12}$$

عدد الحالات الملائمة C_3^1
عدد الحالات الكلية C_{12}^1

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) = \frac{7}{12} + \frac{3}{12} = \frac{10}{12}$$

ثانيا: حالة الاحداث غير المتنافية: إذا كان A و B حدثين غير متنافيين؛ أي أن حدوث حدث لا ينفى أو يمنع حدوث الحدث الآخر أي يمكن وقوع الحدثين معا مثلا لدينا الحدث يمثل الناجحين في الرياضيات والحدث B يمثل نجاح الطالب في مادة الاحصاء، في هذه الحالة هل يمكن أن يكن نجاح الطالب في مادة الرياضيات مانعا للنجاح في مادة الاحصاء، بالطبع لا، هنا يمكن أن نجد طالبا ناجحا في المادتين ولهذا فالاحداث هنا ليست متنافية ويمكن أن تقع مع بعضها البعض، وحتى نعرف كيفية جمع الاحتمالات في الاحداث غير المتنافية سندرج المثال التالي:

مثال: في قسم للطلبة لدينا 25 وعشرون طالب، تم امتحانهم في مادة الرياضيات والاحصاء

نسمي حدث نجاح الطالب في الرياضيات بالحدث A


نسمي حدث نجاح الطالب في الاحصاء بالحدث B

نسمي حدث نجاح الطالب في الرياضيات والاحصاء بالحدث $A \cap B$ أي:

إذا نجح 15 طالب في الرياضيات و20 طالب في الاحصاء وكان عدد الناجحين في المادتين هو 10

الحل:

نعتبر عن المعطيات كما يلي:



تساؤل

لماذا مجموع الحدثين A و B هنا اكبر من عدد الطلبة الموجودين في القسم

الجواب

نلاحظ أن الطالب الناجح في مادتين يتم حسابه مرتين بمعنى أن الطالب

إذا نجح في الرياضيات والاحصاء ($A \cap B$ أي $A \cap B$) نقوم بحسابه مع

الحدث A ونحسبه أيضا مع الحدث B والأصل هو حسابه مرة واحدة


وبالتالي لابد من طرح المرة الزائدة

أي أنه لابد من طرح الطالب الذي يحسب مرتين والذي يمثل التقاطع

$A \cap B$ ومنه يصبح قانون جمع الاحداث غير المتنافية كالتالي:

$$(A \cup B) = (A) + (B) - A \cap B$$

ملاحظة: الرسم يساعد على البرهان لكنه لا يعطي توضيح لكل الحالات وهذا سنلاحظه اذا كان لدينا أكثر من حدثين



$$(A \cup B) = (A) + (B) - A \cap B = 15 + 20 - 10 = 25$$

قاعدة

إذا كان لدينا حدثين A و B غير متنافيين فإن اتحادهما أي مجموعتهما أو احتمال حدوث الحادث A أو الحادث B يتم كما يلي:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

مثال:

تم استجواب أحد المهندسين للحصول على عمل من قبل شركتين A و B , احتمال قبوله في الشركة A هو 0.8 واحتمال أن يتم قبوله في الشركة B هو 0.6 وأن احتمال قبوله في أحد الشركتين على الأقل هو 0.9،

قبل البدء في الحل لابد من فهم التمرين لأنه إذا كان فهم السؤال نصف الإجابة في المواد الأخرى إلا أنه في الاحتمالات بشكل خاص فإن فهم السؤال هو في حد ذاته الإجابة

ما هو احتمال أن أن يتم قبوله في الشركتين معاً؟

الحل:

أولاً: هل الاحداث هنا متنافية أو غير متنافية؟

الحدثين هنا A و B هما غير متنافيين لأنه يمكن وقوعهما في نفس الوقت؛ أي ان المهندس يمكن له ان يتم قبوله في الشركتين معاً ولا يتاثر قبوله في شركة ما بعلاقته بالشركة الأخرى.

ثانياً: ماذا نقصد بقبوله في أحد الشركتين على الأقل؟

يقصد هنا بقوله أحد الشركتين على الأقل هو أن يقبل المهندس إما في الشركة A أو في الشركة

B بالمعنى الاحصائي A أو B أي $A \cup B$

ثالثاً: ماذا نقصد بقبوله في الشركتين معاً؟

نقصد بقبوله في الشركتين معا؛ أي يتم قبول المهندس في نفس الوقت في الشركة A وفي الشركة

B بالمعنى الاحصائي A و B أي $B \cap A$

إذا الحدثين غير متنافين والمطلوب هو $P(A \cap B)$

لدينا $P(A) = 0.8$ $P(B) = 0.6$ $P(A \cup B) = 0.9$

حسب القانون لدينا $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

$$P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B)$$

$$P(A \cap B) = 0.8 + 0.6 - 0.9$$

$$P(A \cap B) = 0.5$$

يمكن للطالب أن يطرح سؤالاً مهماً جداً وهو إذا كان لدينا أكثر من حدثين فكيف ستكون القاعدة هنا؟ وهذا ما سنبينه ببياناً مع الشرح في حالة ثلاثة أحداث وبعدها نعطي القانون الرياضي

في قسم للطلبة لدينا 25 وعشرون طالب، تم امتحانهم في مادة الرياضيات والإحصاء والمحاسبة

نسبي حدث نجاح الطالب في الرياضيات بالحدث A

نسبي حدث نجاح الطالب في الإحصاء بالحدث B

نسبي حدث نجاح الطالب في الاحتمالات بالحدث C

نسبي حدث نجاح الطالب في الرياضيات والاحصاء بالحدث A و B أي: $A \cap B$

نسبي حدث نجاح الطالب في الرياضيات والمحاسبة بالحدث A و C أي: $A \cap C$

نسبي حدث نجاح الطالب في المحاسبة والاحصاء بالحدث B و C أي: $C \cap B$

نسبي حدث نجاح الطالب في الرياضيات والاحصاء والمحاسبة بالحدث A و B و C أي: $A \cap B \cap C$

إذا نجح 15 طالب في الرياضيات و 20 طالب في الإحصاء و 12 طالب في المحاسبة، وكان عدد


الناجحين في الرياضيات والاحصاء 10 وعدد الناجحين في الرياضيات والمحاسبة 7 وعدد الناجحين

في المحاسبة والاحصاء 10 أما عدد الناجحين في كل المواد فهو 5 طلبة

ما هو احتمال أن نختار طالب ويكون ناجح في مادة،

الحل:

أولاً: قبل البداية في حل التمرين يستحسن ان يتم تخيله اورسمه حيث سنقوم باعداد **الرسم التالي** الذي يبين لنا معطيات التمرين بالتفصيل:



تساؤل

لماذا مجموع الأحداث A و B و C هنا اكبر من عدد الطلبة الموجودين في القسم

الجواب

نلاحظ أن الطالب الناجح في مادتين حسابه مرتين بمعنى أن الطالب إذا نجح في الرياضيات والاحصاء

($A \cap B$ و $A \cap C$ و $C \cap B$)، كما أن هناك من نجح في ثلاثة مواد ($A \cap B \cap C$)

نقوم بحسابه مع الحادث A ونحسبه مع الحادث B ونحسبه أيضاً مع الحادث C والأصل هو

حسابه مرة واحدة وبالتالي لابد من طرح المرة الزائدة

أي أنه لابد من طرح الطالب الذي يحسب مرتين والذي يمثل التقاطع والاحصاء ($A \cap B$ و $A \cap C$ و $C \cap B$) ومنه يصبح قانون جمع الاحداث غير المتنافية كالتالي:

$$(A \cup B \cup C) = (A) + (B) + (C) - A \cap B - A \cap C - C \cap B$$

$$= 15 + 20 + 12 - 10 - 7 - 10 = 20 < 25$$

نلاحظ أن الطالب الذي نجح في ثلاث مواد يشترك في كل التقاطعات وبالتالي فقد تم طرحه ثلاث مرات أي انه تم حذفه تماما لذا لابد من حسابه وهو يمثل

$$(A \cap B \cap C)$$

ومنه يكون القانون كالتالي:

$$(A \cup B \cup C) = (A) + (B) + (C) - A \cap B - A \cap C - C \cap B + (A \cap B \cap C) \\ = 15 + 20 + 12 - 10 - 7 - 10 + 5 = 25$$

ومنه إذا كانت لدينا ثلاث أحداث غير متنافية يكون مجموع احتمالاتهم كالتالي:

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(C \cap B) + P(A \cap B \cap C)$$

تساؤل


هل هناك قانون عام في حالة وجود عدد من الأحداث غير المتنافية

الجواب

في حالة وجود عدد من الأحداث غير المتنافية نستخدم القانون التالي:

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n) - P(A_1 \cap A_2) - \dots \\ - P(A_{n-1} \cap A_n) + P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) + \dots + P(A_{n-2} \cap A_{n-1} \cap A_n) \dots \\ \dots (-1)^{n-1} P(A_1 \cap A_2 \cap A_3 \dots A_n)$$

مثال:



إذا كان لدينا الشكل التالي:

حدد، $P(A - B)$ ، $P(A \cap B)$

الحل:

$$P(A - B) = P(A) - P(A \cap B)$$

$$P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B)$$

مثال:

أطلق صيادان نحو هدف معين فإذا كان احتمال إصابة الأول للهدف هو 0.8 ، واحتمال إصابة الثاني للهدف هو 0.6.

أحسب احتمال:

(A إصابة الهدفين معا، B إصابة الهدف

قبل البدء دائما في حل
أي تمرين نحدد هل
الاحداث مستقلة ام لا
متنافية أم لا

الحل:

$$P(E_1) = 0.8 \leftarrow \text{حدث إصابة الأول الهدف}$$

$$P(E_2) = 0.6 \leftarrow \text{حدث إصابة الثاني الهدف}$$

المصدر الاول للطالب الجزائري

أولا: الحادثين هنا مستقلين لماذا؟ لأن إصابة أو عدم إصابة الصياد الأول للهدف مستقل ولا يؤثر على الصياد الثاني.
ثانيا: الحادثين هنا غير متنافيين لماذا؟ لأنه يمكن إصابة الهدف للصيادين معا أي ان إصابة الهدف من طرف أحد الصيادين لا ينفي إصابة الهدف من طرف الصياد الآخر

(A إصابة الهدفين معا، معناه إصابة الصياد الأول للهدف و إصابة الصياد الثاني للهدف أي:

$$P(E_1 \cap E_2)$$

$$P(E_1 \cap E_2) = P(E_1)P(E_2) \leftarrow \text{وبما أن الحادثان مستقلان:}$$

$$P(E_1 \cap E_2) = P(E_1)P(E_2) = (0.8)(0.6) = 0.48$$

(B) إصابة الهدف، نقصد هنا باصابة الهدف أنه يتم اصابة الهدف من قبل الصياد الأول أو من قبل الصياد الثاني، ويفسر أيضا أنه اصابة الهدف على الأقل من قبل أحد الصيادين وكلا التفسيرين لهما نفس الحل، نحن نعرف أنه رياضيا نقصد بعبارة أو الاتحاد أو الجمع $\cup$ ، $+$

وبما أن الحدثان غير متنافيين: $\leftarrow P(E_1 \cup E_2) = P(E_1) + P(E_2) - P(E_1 \cap E_2)$

$$P(E_1 \cup E_2) = P(E_1) + P(E_2) - P(E_1 \cap E_2)$$

$$P(E_1 \cup E_2) = (0.8)(0.6) + (0.6) - 0.48$$

$$= 0.92$$

مثال:

أطلق أحد الرماة طلقة واحدة على هدف معين مؤلف من ثلاث مناطق مرقمة 1، 2، 3 ، فإذا علمت أن احتمال وقوع الاصابة في هذه المناطق هو على التوالي: 0.15، 0.23، 0.14، السؤال هنا هو: ما هو احتمال عدم الاصابة لهذا الهدف

الحل:

نلاحظ أن لدينا هنا ثلاث أحداث، كما أن المطلوب هو الحدث العكسي أي عدم الاصابة

تذكير:

قبل البدء في الحل نتذكر أحد قوانين الاحتمالات وهو الخاص بالاحتمال والاحتمال المعاكس له

$$P(E) + P(\bar{E}) = 1 \rightarrow P(\bar{E}) = 1 - P(E)$$

أولاً: أول ما نقوم به هنا هو حساب الاحتمالات المعاكسة: أي احتمال عدم الاصابة لأننا نبحث عن احتمال عدم الاصابة

E_1 : حدث اصابة المنطقة 1 ، $\bar{E}_1$: حدث عدم اصابة المنطقة 1

$$P(E_1) = 0.15 \rightarrow P(\bar{E}_1) = 1 - 0.15 = 0.85$$

E_2 : حدث اصابة المنطقة 2 ، $\bar{E}_2$: حدث عدم اصابة المنطقة 2

$$P(E_2) = 0.23 \rightarrow P(\bar{E}_2) = 1 - 0.23 = 0.77$$

E_3 : حدث اصابة المنطقة 3 ، $\bar{E}_3$: حدث عدم اصابة المنطقة 3

$$P(E_3) = 0.14 \rightarrow P(\bar{E}_3) = 1 - 0.15 = 0.86$$

ثانياً: تحديد هل الأحداث متنافية أم لا ومستقلة أم لا حتى نستطيع تحديد القانون المناسب

الحوادث هنا غير متنافيين لماذا؟ لأن

$$P(\bar{E}_1) + P(\bar{E}_2) + P(\bar{E}_3) = 2.48 > 1$$

الحوادث هنا مستقلة لماذا؟ لأن إصابة أي منطقة مستقل عن المنطقة الأخرى أي:

$$P(\bar{E}_1 \cap \bar{E}_2) = P(\bar{E}_1)P(\bar{E}_2)$$

$$\begin{aligned}
 P(\bar{E}_1 \cap \bar{E}_3) &= P(\bar{E}_1)P(\bar{E}_3) \\
 P(\bar{E}_2 \cap \bar{E}_3) &= P(\bar{E}_2)P(\bar{E}_3) \\
 P(\bar{E}_1 \cap \bar{E}_2 \cap \bar{E}_3) &= P(\bar{E}_1)P(\bar{E}_2)P(\bar{E}_3)
 \end{aligned}$$

ثالثا: تحديد الهدف المطلوب ألا وهو حساب $P(\bar{E}_1 \cup \bar{E}_2 \cup \bar{E}_3)$

بما أن الاحداث غير متنافية فإن:

$$\begin{aligned}
 P(\bar{E}_1 \cup \bar{E}_2 \cup \bar{E}_3) &= P(\bar{E}_1) + P(\bar{E}_2) + P(\bar{E}_3) - P(\bar{E}_1 \cap \bar{E}_2) - \\
 &\quad P(\bar{E}_1 \cap \bar{E}_3) - P(\bar{E}_2 \cap \bar{E}_3) + P(\bar{E}_1 \cap \bar{E}_2 \cap \bar{E}_3)
 \end{aligned}$$

ومنه:

$$\begin{aligned}
 P(\bar{E}_1 \cup \bar{E}_2 \cup \bar{E}_3) &= P(\bar{E}_1) + P(\bar{E}_2) + P(\bar{E}_3) - P(\bar{E}_1)P(\bar{E}_2) - \\
 &\quad P(\bar{E}_1)P(\bar{E}_3) - P(\bar{E}_2)P(\bar{E}_3) + P(\bar{E}_1)P(\bar{E}_2)P(\bar{E}_3)
 \end{aligned}$$

التعويض العددي:

$$\begin{aligned}
 P(\bar{E}_1 \cup \bar{E}_2 \cup \bar{E}_3) &= 0.85 + 0.77 + 0.86 - 0.85 \times 0.77 - \\
 &\quad 0.85 \times 0.86 - 0.77 \times 0.86 + 0.85 \times 0.77 \times 0.86 \\
 &= 0.99517
 \end{aligned}$$

بعض قوانين الاحتمال: إذا كانت A و B حدثان من فضاء العينة S فإن::

$$P(A - B) = P(A \cap \bar{B}) = P(A) - P(A \cap B)$$

$$P(A) = P(A \cap \bar{B}) + P(A \cap B)$$

$$P(B) = P(\bar{A} \cap B) + P(A \cap B)$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(\bar{A} \cap B)$$

$$P(A \cup B) = P(B) + P(A \cap \bar{B})$$

$$P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - P(A \cup B)$$

الاحتمال الشرطي ونظرية بايز

Conditional Probability And Bay's Theorm.

من الاكيد أن هناك قرارات كثيرة في حياتنا مرتبطة بتحقيق حدث آخر، كما أن مدراء الشركات حين يتخذون العديد من القرارات يحتاجون إلى معرفة مدى قدرة تحقق الحدث A بناء على معطيات حدوث حدث آخر B عدث فعلا. مثلا إذا كان مطلوبا من المدير أن يتخذ قرارا بنشر اعلان دعائي لسلعة ما في التلفزيون فانه يكون مهتما بمعرفة ما احتمال أن شخصا ما سيشتري السعة (الحدث A) إذا كان قد حصل أن شاهد الإعلان التلفزيوني (الحدث B).

وهكذا فان احتمال وقوع الحادث A يشترط وقوع الحادث B يدعى بالاحتمال الشرطي، نقرأها

كما يلي:

احتمال حدوث الحادث A علما أن الحادث B قد وقع
احتمال حدوث الحادث A شرط أن الحادث B قد وقع
احتمال حدوث الحادث A إذا كان الحادث B قد وقع

$$p(A|B)$$

احتمال حدوث الحادث A
هنا هو احتمال شرطي لانه يرتبط
بحدوث الحادث B ويرمز له
كالتالي:

SAHLA MAHLA

المصدر الاول للطالب الجرائري قاعدة:

إذا كان $(P; \mathcal{E}; S)$ فضاء احتماليا وكان B حدثا احتماله لا يساوي الصفر و
حدثا اختياريا فان الاحتمال الشرطي للحدث A علما بأن B قد وقع هو بالتعريف:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad P(B) \neq 0$$

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \quad P(A) \neq 0$$

خصائص الاحتمال الشرطي:

الخاصية الأولى:

بما أن التقاطع يعبر عن الضرب والضرب تبديلي فإن:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B \cap A)}{P(B)} \quad P(B) \neq 0$$

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{P(B \cap A)}{P(A)} \quad P(A) \neq 0$$

الخاصية الثانية:

بحسب القانون الذي درسناه للاحتمال الشرطي نلاحظ الاتي:

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \rightarrow P(A \cap B) = P(A)P(B|A) \quad P(A) \neq 0$$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \rightarrow P(A \cap B) = P(B)P(A|B) \quad P(B) \neq 0$$

نلاحظ أن التقاطع $P(A \cap B)$ له حالتين للحساب وهذا ما يحدد معرفة الحدث الشرطي

من الحدث المحتما

الخاصية الثالثة:

إذا كان لدينا حدثين متنافيين A و B فإن: نحن نعرف أن تقاطع الاحداث المتنافية **صفر 0**

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \rightarrow P(A \cap B) = 0 \quad P(A) \neq 0$$

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0}{P(A)} = 0$$

أي أنه في حالة الاحداث المتنافية فإن **$P(B|A) = 0$**

الخاصية الرابعة:

$$P(\bar{B}|\bar{A}) = \frac{P(\bar{A} \cap \bar{B})}{P(\bar{A})} \quad P(A) \neq 0$$

حسب قانون ديمورقان: فإن

$$P(\bar{A} \cap \bar{B}) = P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B)$$

$$\frac{P(\bar{A} \cap \bar{B})}{P(\bar{A})} = \frac{P(\overline{A \cup B})}{P(\bar{A})} = \frac{1 - P(A \cup B)}{1 - P(A)}$$

الخاصية الخامسة:

إذا كان لدينا الحدثين A و B مستقلين فإن: $P(A \cap B) = P(A)P(B)$

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{P(A)P(B)}{P(A)} = P(B)$$

أي أنه في حالة الاحداث المستقلة فإن: $P(B|A) = P(B)$

الخاصية السادسة:

إذا كان لدينا $A \in B$ مستقلين فإن: $P(A \cap B) = P(A)$

$$P(B|A) = \frac{P(A)}{P(A)} = 1 = P(B)$$

$$P(A|B) = \frac{P(A)}{P(B)}$$

الخاصية السابعة:

إذا كان لدينا ا: $P(A_1 \cap A_2) = P(A_1) P(A_2|A_1)$

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = P(A_1) P(A_2|A_1) P(A_3|A_2 \cap A_1)$$

ويمكن تعميم احتمال ضرب عدة حوادث $A_1, A_2, \dots, A_n$

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) P(A_2|A_1) P(A_3|A_2 \cap A_1) \dots \\ \dots P(A_n|A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{n-1})$$

الخاصية الثامنة:

إذا كان لدينا ا: (A, B, C) أحداث مستقلة فإن:

$$P(A|B \cap C) = \frac{P(A \cap B \cap C)}{P(B \cap C)} = \frac{P(A)P(B)P(C)}{P(B)P(C)} = P(A)$$

ويمكن التعميم كالتالي:

$$P(B|A \cap C) = P(B)$$

$$P(C|A \cap B) = P(C)$$

الخاصية التاسعة:

إذا كان لدينا $(A$ و B و $C)$ أحداث متنافية. فإن:

$$\begin{aligned} P((A \cup B)|C) &= \frac{P((A \cup B) \cap C)}{P(C)} = \frac{P((A + B) \cap C)}{P(C)} \\ &= \frac{P((A) \cap C) + P((B) \cap C)}{P(C)} = \frac{P(A \cap C) + P(B \cap C)}{P(C)} \\ &= \frac{P(A \cap C)}{P(C)} + \frac{P(B \cap C)}{P(C)} = P((A)|C) + P((B)|C) \end{aligned}$$

الخاصية العاشرة:

إذا كان لدينا $(A$ و B و $C)$ أحداث غير متنافية. فإن:

$$\begin{aligned} P((A \cup B)|C) &= \frac{P((A \cup B) \cap C)}{P(C)} = \frac{P((A + B - A \cap B) \cap C)}{P(C)} \\ &= \frac{P((A) \cap C) + P((B) \cap C) - P((A \cap B) \cap C)}{P(C)} \\ &= \frac{P(A \cap C) + P(B \cap C) - P(A \cap B) \cap P(C)}{P(C)} \\ &= \frac{P(A \cap C)}{P(C)} + \frac{P(B \cap C)}{P(C)} - \frac{P(A \cap B) \cap P(C)}{P(C)} \\ &= P((A)|C) + P((B)|C) - P((A \cap B)|C) \end{aligned}$$

الخاصية الحادية عشر:

إذا كان لدينا: (A و B) أحداث غير متنافية. فإن:

$$\begin{aligned} P(\bar{A}|B) &= \frac{P(\bar{A} \cap B)}{P(B)} = \frac{P((1-A) \cap B)}{P(B)} \\ &= \frac{P(1 \cap B) - P(A \cap B)}{P(B)} \\ &= \frac{P(B)}{P(B)} - \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = 1 - \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = 1 - P(A|B) \end{aligned}$$

الخاصية الثانية عشر:

إذا كان لدينا: (A و B) أحداث غير متنافية. فإن:

$$P(A|\bar{B}) = \frac{P(A \cap \bar{B})}{P(\bar{B})} = \frac{P(A) - P(A \cap B)}{1 - P(B)}$$

مثال:

الجدول التالي يبين توزيع العاملين في مصنع ما تبعا للجنس والحالة الوظيفية كالتالي:

الجنس / العمل	عامل	اداري	المجموع
ذكر	78	22	100
أنثى	46	34	80
المجموع	124	56	180

س1. اخترنا شخصا عشوائيا من هذا المصنع، ما احتمال أن يكون رجلا علما أنه عامل.

س2. اخترنا شخصا عشوائيا من هذا المصنع، ما احتمال أن يكون أنثى من الاداريين.

الحل:

قبل البدء دائما في حل
أي تمرين لابد من
قراءة الاسئلة جيدا

نلاحظ أن السؤال الأول هو احتمال شرطي لان وقوع حادث أن
الشخص المختار رجلا **مشروط** بأن يكون عاملا.
المطلوب الأول هو: **احتمال** أن يكون الشخص المختار رجلا **شرط** أنه عامل،
أولا: نحدد الرموز كما نحب.

الحادث A هو حادث خاص بان يكون الشخص رجلا. و $\bar{A}$ حادث خاص بان يكون الشخص
إمرأة.

الحادث B هو حادث خاص بان يكون الشخص عاملا. و $\bar{B}$ حادث خاص بان يكون الشخص
إداريا.

في حال أخطأ الطالب وكتب
 $P(B|A)$ فانه هنا قد عكس
السؤال وبالتالي هنا لابد من
التأكد جيدا من ما نكتبه

ثانيا: تحديد المطلوب $P(A|B)$ ،
ثالثا: تحديد القانون المستخدم حسب ما

درسناه سابقا

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

رابعا: حساب الاحتمالات المطلوبة

هنا نحسب احتمال أن يكون الشخص المسحوب عاملا دون تحديد هل يتبع الاناث أم
الذكور $P(B)$:

$$P(B) = \frac{\text{عدد العمال}}{\text{العدد الكلي}} = \frac{124}{180}$$

$P(A \cap B)$: هنا نحسب احتمال أن يكون الشخص المسحوب رجلا وعاملا في نفس الوقت

$$P(A \cap B) = \frac{\text{عدد العمال الرجال}}{\text{العدد الكلي}} = \frac{78}{180}$$

خامسا: حساب الاحتمال المطلوب $P(A|B)$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{78/180}{124/180} = \frac{78}{124} = 0.629$$

المطلوب الثاني هو: **احتمال** أن يكون الشخص المختار أنثى **شرط** أنها من الاداريين.
باتباع الخطوات السابقة:

$$P(\bar{A}|\bar{B}) = \frac{P(\bar{A} \cap \bar{B})}{P(\bar{B})} = \frac{34/180}{56/180} = \frac{34}{56} = 0.607$$

مثال:

إذا كان لدينا:

$$P(E_1) = 0.7 \quad P(E_2) = 0.8 \quad P(E_1 \cap E_2) = 0.6$$

أحسب:

$$\begin{array}{lll} a) P(E_1|E_2) & b) P(E_2|E_1) & c) P(E_1|\bar{E}_2) \\ d) P(\bar{E}_1|E_2) & e) P(\bar{E}_1|\bar{E}_2) & \end{array}$$

الحل:

بالنسبة للحالة a و b نستخدم القانون العادي للاحتمال الشرطي:

$$\begin{array}{ll} a) P(E_1|E_2) = \frac{P(E_1 \cap E_2)}{P(E_2)} = \frac{0.6}{0.8} \\ b) P(E_2|E_1) = \frac{P(E_2 \cap E_1)}{P(E_1)} = \frac{0.6}{0.7} \end{array}$$

بالنسبة للحالة c نستخدم الخاصية الثانية عشر:

$$c) P(E_1|\bar{E}_2) = \frac{P(E_1 \cap \bar{E}_2)}{P(\bar{E}_2)} = \frac{P(E_1) - P(E_1 \cap E_2)}{1 - P(E_2)} = \frac{0.7 - 0.6}{1 - 0.8} = \frac{0.1}{0.2} = \frac{1}{2}$$

بالنسبة للحالة d نستخدم الخاصية الحادية عشر:

$$d) P(\bar{E}_1|E_2) = \frac{P(\bar{E}_1 \cap E_2)}{P(E_2)} = 1 - \frac{P(E_1 \cap E_2)}{P(E_2)} = 1 - \frac{0.6}{0.8} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$$

بالنسبة للحالة e نستخدم قانون ديمورقان الذي تم التطرق إليه في الخاصية الرابعة:

$$\begin{aligned} e) P(\bar{E}_1|\bar{E}_2) &= \frac{P(\bar{E}_1 \cap \bar{E}_2)}{P(\bar{E}_2)} = \frac{P(\bar{E}_1 \cup \bar{E}_2)}{P(\bar{E}_2)} \\ &= \frac{1 - P(E_1 \cup E_2)}{1 - P(E_2)} = \frac{1 - [P(E_1) + P(E_2) - P(E_1 \cap E_2)]}{1 - 0.8} \\ &= \frac{1 - [0.7 + 0.8 - 0.6]}{1 - 0.8} = \frac{1 - [0.9]}{0.2} = \frac{0.1}{0.2} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

مثال:

إذا كان لدينا:

$$P(E_1|E_2) = 0.3 \quad P(E_2) = 0.45$$

أحسب:

$$a) P(E_1 \cap E_2) \quad b) P(\overline{E_1} \cup \overline{E_2})$$

الحل:

$$\begin{aligned} a) P(E_1 \cap E_2) &= P(E_1|E_2)P(E_2) \\ &= 0.3 \times 0.45 \\ &= 0.135 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b) P(\overline{E_1} \cup \overline{E_2}) &= P(\overline{E_1 \cap E_2}) \\ &= 1 - P(E_1 \cap E_2) \\ &= 1 - 0.135 \\ &= 0.865 \end{aligned}$$

مثال:

أظهر تصنيف لطلاب الجامعة أن 10 بالمائة من الطلاب يدخنون، وأن 30 بالمائة من الطلاب يشربون القهوة، وأن 5 بالمائة من الطلاب يدخنون ويشربون القهوة،
 أ) أحسب النسبة المئوية للطلاب الذين لا يدخنون ولا يشربون القهوة؟
 ب) من بين الطلاب المدخنين ماهي نسبة الطلاب الذين يشربون القهوة؟
 ج) من بين الطلاب الذين لا يشربون القهوة ماهي نسبة المدخنين؟

الحل:

أولاً: نحدد الرموز كما نحب.

الحادث A هو حادث خاص بأن يكون الطالب مدخنًا. $\overline{A}$ حادث بأن يكون الطالب غير مدخن.

الحادث B هو حادث بأن يكون الطالب يشرب القهوة. $\overline{B}$ حادث خاص بأن الطالب لا يشرب القهوة.

ثانياً: تحديد المطلوب

أ) حساب النسبة المئوية للطلاب الذين لا يدخنون ولا يشربون القهوة

نبحث هنا عن نسبة الطلاب الذين لا يدخنون ولا يشربون القهوة، أي أننا نبحث هنا عن التقاطع

$$P(\overline{A} \cap \overline{B})$$

حسب قانون **ديمورقان** المذكور في الخاصية الرابعة فإن:

$$\begin{aligned}P(\bar{A} \cap \bar{B}) &= 1 - P(A \cup B) \\&= 1 - [P(A) + P(B) - P(A \cap B)] \\&= 1 - [0.10 + 0.30 - 0.05] \\&= 0.65\end{aligned}$$

أي أن 65 بالمائة من الطلاب لا يدخنون ولا يشربون القهوة.

(ب) من بين الطلاب المدخنين ماهي نسبة الطلاب الذين يشربون القهوة

نفهم من السؤال هنا أن الشرط هنا أو العلوم هو أن الطالبة يدخن فما احتمال أن يكون يشرب القهوة، أي اننا هنا أمام احتمال شرطي وحسب قانون الاحتمال الشرطي فإن:

$P(B|A)$ وتقرأ كما يلي: ما احتمال حدوث الحادث B الذي يمثل الطلبة المدخنين علماً أن الطالب المختار هو من الذين يشربون القهوة والذي يمثل الحادث A

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0.05}{0.10} = \frac{1}{2} = 0.50$$

أي أن 50 بالمائة من الطلبة المدخنين يشربون القهوة

(ج) من بين الطلاب الذين لا يشربون القهوة ما هي نسبة المدخنين؟

نفهم من السؤال هنا أن الشرط هنا أو العلوم هو أن الطالبة لا يشربون القهوة فما احتمال أن يكونو مدخنين، أي اننا هنا أمام احتمال شرطي وحسب قانون الاحتمال الشرطي فإن:

$P(A|\bar{B})$ وتقرأ كما يلي: ما احتمال حدوث الحادث A الذي يمثل الطلبة الذين يشربون القهوة

المدخنين علماً أن الطالب المختار هو من الذين لا يدخنون

بالرجوع للخاصية الثانية عشر التي تم دراستها فإن:

$$P(A|\bar{B}) = \frac{P(A \cap \bar{B})}{P(\bar{B})} = \frac{P(A) - P(A \cap B)}{1 - P(A)} = \frac{0.10 - 0.05}{1 - 0.30} = 0.071$$

مثال:

كيس يحتوي على 3 كرات سوداء و 7 كرات بيضاء، إذا سحبنا منه **كرتين كل كرة على حدى ودون**

إرجاع،

أرسم الشجرة الاحتمالية وحدد ل الحالات المركبة الممكنة،

الحل:

قبل البدء في الحل لابد ان
نعرف أن ننتبه إلى طبيعة
السحب وإلى عدد الكرات
المسحوبة

أولاً: عدد الكرات المسحوبة هو كرتين


طريقة السحب هي: كل كرة على حدى دون ارجاع أي؛

الكرة الأولى نسحبها من كيس به 10 كرات والكرة الثاني نسحبها من كيس به 9 كرات،

ثانيا: نحدد الرموز كما نشاء المهم أن نلتزم بها،

نرمز لحادث سحب الكرة البيضاء بالرمز **A**

نرمز لحادث سحب الكرة السوداء بالرمز **B**




من خلال الشجرة الاحتمالية نلاحظ أن الكيس قبل سحب الكرة الأولى به 10 كرات وفي الكرة الثانية بقي به 9 كرات لكنه يختلف حسب الكرة المسحوبة في السحبة الأولى، بمعنى أنه عندما سحبنا منه كرة بيضاء بقي في الكيس 6 كرات بيضاء و3 كرات سوداء، وعندما كانت الكرة الأولى المسحوبة هي كرة سوداء نلاحظ أنه بقي في الكيس 7 كرات بيضاء و2 كرات سوداويتين و9 كرات، لذلك على الطالب أن يدرك أن الكيس الأول يختلف عن الكيس الثاني حسب ما تم سحبه،

ملاحظة جد مهمة : حتى لا تختلط على الطالب وتصبح عليه الأمور لابد عليه بأن يستعين

بالشجرة الاحتمالية التي من شأنها توضيح مراحل الاحتمال بالتفصيل

تحديد كل الثنائيات الممكنة (الحالات المركبة الممكنة) عند سحب كرتين،
كما قلنا سابقا لابد أن نستعين لاشجرة الاحتمالية حتى يسهل علينا حل أي سؤال:



من خلال الشجرة نلاحظ أن هناك أربع ثنائيات كالتالي:
الحالة الأولى: سحب كرتين بيضاوتين كرة بيضاء في السحبة الأولى وكرة بيضاء في السحبة الثانية شرط

أن السحبة الأولى بيضاء $P(A)P(A|A)$

الحالة الثانية: سحب كرة بيضاء والثانية سوداء ؛ الكرة الأولى بيضاء والثانية سوداء علما أن الأولى

بيضاء $P(A)P(B|A)$

الحالة الثالثة: سحب كرة سوداء والثانية بيضاء ؛ الكرة الأولى سوداء والثانية بيضاء علما أن الأولى

سوداء $P(B)P(A|B)$

الحالة الرابعة: سحب كرتين سوداوتين كرة سوداء في السحبة الأولى وكرة سوداء في السحبة الثانية

شرط أن السحبة الأولى سوداء $P(B)P(B|B)$

مثال:

لدينا صندوق يحتوي على 10 كرات بيضاء و 5 كرات سوداء، نسحب منه 4 كرات على التوالي

دون ارجاع

أوجد احتمال أن تكون إحدى هذه الكرات سوداء،

الحل:

السحب هنا على التوالي ودون ارجاع، كما أن عدد المسحوب هو أربع كرات

أولاً: لابد أن نفهم ما المقصود بالسؤال

نفهم من السؤال القائل أن تكون إحدى هذه الكرات

سوداء أي: على الأقل كرة كرة سوداء واحدة،

نرمز للكرة السوداء A والكرة البيضاء B

أي أننا بصدد البحث عن $P(A)$ وهذا الحادث يتحقق بعدد كبير من الحالات وحتى نتجنب

كثرة الحالات نقوم بحساب الحدث المعاكس $P(\bar{A})$ وذلك لأن الحادث المعاكس يعبر عن أن كل الكرات

المسحوبة ليست بيضاء أي سوداء.

هنا لابد أن نحدد لكل كرة في أي سحبة رمز:

B_1 : الكرة الأولى بيضاء،

B_2 : الكرة الثانية بيضاء،

B_3 : الكرة الثالثة بيضاء،

B_4 : الكرة الرابعة بيضاء،

$$\bar{A} = B_1 \cap B_2 \cap B_3 \cap B_4$$

ومنه:

حسب قانون الضرب الذي تم التطرق له في الخاصية السابعة:

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_2 \cap A_1) \dots$$

$$P(A_3|A_2 \cap A_1 \cap \dots \cap A_{n-1})$$

فإن:

$$\begin{aligned} P(\bar{A}) &= P(B_1 \cap B_2 \cap B_3 \cap B_4) \\ &= P(B_1)P(B_2|B_1)P(B_3|B_2 \cap B_1)P(B_4|B_1 \cap B_2 \cap B_3) \\ &= \frac{10}{15} \cdot \frac{9}{14} \cdot \frac{8}{13} \cdot \frac{7}{12} = \frac{2}{13} \end{aligned}$$

ومنه:

$$P(\bar{A}) + P(A) = 1 \rightarrow P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{2}{13} = \frac{11}{13}$$


نظرية التجزئة

Theorm

إذا كان لدينا $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ مجموعة من الحوادث تشكل تجزئة لفضاء عينة S وكان B حدث يمكن أن يقع مع أي حدث من هذه المجموعة فإن احتمال وقوع الحدث S يعطي العلاقة،

$$P(B) = P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2) + \dots + P(A_n)P(B|A_n)$$

ولتوضيح ما تم ذكره نستخدم شكل فن التالي:



من الواضح أن

$$B = (A_1 \cap B) \cup (A_2 \cap B) \cup \dots \cup (A_n \cap B)$$

وبحساب الاحتمال للطرفين وبملاحظة أن الطرف الأيمن هو اتحاد لحوادث متنافية نجد أن:

$$B = (A_1 \cap B) + (A_2 \cap B) + \dots + (A_n \cap B)$$

وبتطبيق قاعدة ضرب الاحتمالات نجد أن:

$$P(B) = P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2) + \dots + P(A_n)P(B|A_n)$$

مثال:

لدينا ثلاث طرق تؤدي إلى بئر العاتر من ولاية قلمة، إختار شخص أحد هذه الطرق عشوائيا،

إذا إختار الطريق الأول فاحتمال وصوله الى بئر العاتر هو $\frac{1}{8}$

إذا إختار الطريق الثاني فاحتمال وصوله الى بئر العاتر هو $\frac{1}{4}$

إذا إختار الطريق الثالث فاحتمال وصوله الى بئر العاتر هو $\frac{1}{3}$

أوجد احتمال أن يصل الشخص إلى بئر العاتر

الحل:


الحدث A هو اختيار الطريق الأول

الحدث B هو اختيار الطريق الثاني

الحدث C هو اختيار الطريق الثالث

نلاحظ أن الأحداث A و B و C تشكل تجزئة لفضاء العينة S المرافق لتجربة الاختيار

العشوائي للوصول إلى بئر العاتر وليكن الحادث R يمثل الوصول إلى بئر العاتر ويبين الحدث R بالجزء المظلل في الشكل التالي:



وبما أن المطلوب هنا هو حساب $P(R)$ أي أن الهدف هنا هو حساب احتمال الوصول مهما كان الطريق

وبما أن الاختيار عشوائي فمعناه أن احتمال اختيار أي طريق هو $\frac{1}{3}$ ، أي:

$$P(B) = P(A) = P(C) = \frac{1}{3}$$

$$P(R|A) = \frac{1}{8}$$

$$P(R|B) = \frac{1}{4}$$

$$P(R|C) = \frac{1}{3}$$

وبالاستعانة بالشكل السابق يمكن حساب الاحتمال الكلي كالتالي:

$$\begin{aligned} P(R) &= P(A)P(R|A) + P(B)P(R|B) + P(C)P(R|C) \\ &= \frac{1}{3} \times \frac{1}{8} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = 0.236 \end{aligned}$$

نظرية بايز Bay's Theorm.

افترض أننا نعرف الاحتمالات الشرطية للحدث لجميع "الأسباب" المحتملة لهذا الحدث. يمكننا استخدام هذه المعلومات للعثور على احتمال أحد تلك الأسباب المحتملة، على أساس أن هذا الحدث قد وقع.

نفرض أن $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ حوادث مستقلة ومتنافية من فضاء العينة S آخر، فإن:
حيث أن:

$$P(A_i) \neq 0 ; \quad i = 1; \dots \dots \dots n$$

وأن B أي حدث من فضاء العينة S بحيث أن


$$P(B) \neq 0 ; \quad i = 1; \dots \dots \dots n$$

ومنه فإن قانون بايز هو كالتالي:

$$P(A_i|B) = \frac{P(B|A_i)P(A_i)}{\sum_{k=1}^n P(B|A_k)P(A_k)}$$

البرهان:

يمكن توضيح الحوادث وفراغ العينة بشكل فن كالتالي:



من الشكل نلاحظ أن الحادثة B عبارة عن اتحاد مجموعة من الأحداث المتنافية التالية:

$$A_1B, A_2B, \dots, A_nB$$

أي أن:

$$B = A_1B \cup A_2B \cup \dots \cup A_nB$$

وحسب قاعدة الاتحاد عند الأحداث المتنافية المذكورة سابقاً فإن:

$$P(B) = P(A_1B) + P(A_2B) + \dots + P(A_nB)$$

$$= \sum_{i=1}^n P(A_iB)$$

$$= \sum_{i=1}^n P(B|A_i)P(A_i) \dots \dots \dots 1$$

ومن تعريف الاحتمال الشرطي

$$P(A_i|B) = \frac{P(A_i \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B|A_i)P(A_i)}{P(B)} \dots \dots \dots 2$$

من 1 و 2 نحصل على:

$$P(A_i|B) = \frac{P(B|A_i)P(A_i)}{\sum_{i=1}^n P(B|A_k)P(A_k)}$$

مثال:

مدرسة ثانوية من ثلاث صفوف، ربع المدرسة في الصف الأول وثلاثها في الثاني، إذا كان سدس طلاب الصف الأول وربع طلاب الصف الثاني وثلاث طلاب الصف الثالث أعضاء في الجمعية الرياضية إختارنا طالباً بصفة عشوائية فكان عضواً في الجمعية، فما احتمال أنه من الصف الأول.

الحل:

دائماً قبل الحل لابد من فهم السؤال جيداً
وتلخيص المعطيات جيداً، وافتل طريقة
هنا للتلخيص هي الشجرة الاحتمالية

أولاً: لابد من تحديد الرموز والنسب بالارقام

نرمز لطلاب الصف الأول بالرمز $P(A_1)$ وتمثل $\frac{1}{4}$ من العدد الاجمالي

نرمز لطلاب الصف الثاني بالرمز $P(A_2)$ وتمثل $\frac{1}{3}$ من العدد الاجمالي

نرمز لطلاب الصف الأول بالرمز $P(A_3)$ وتمثل الباقي أي $\frac{5}{12}$ وتم حسابه كما يلي:

$$P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) = 1$$

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{3} + P(A_3) = 1 \rightarrow P(A_3) = 1 - \frac{1}{4} - \frac{1}{3} \rightarrow P(A_3) = \frac{5}{12}$$

أما بالنسبة للانتماء للجمعية فنرمز له بالرمز C

هنا لابد من التركيز في كتابة الرموز والتعبير عن الطلبة الذين ينتمون للجمعية

من الاحطاء الشائعة لدى الطلبة في الحل هنا هي أن الطالب يعبر عن المعطيات كالتالي:

طلبة الصف الاول الذين ينتمون للجمعية بالرمز $P(C)$ والخطأ هنا أن $P(C)$ لا يبين الي

اي صف ينتمي الطلبة المقصودين بل هنا يفهم على المجمل أي نفهم من $P(C)$ الطلبة الذين ينتمون

للجمعية وهم من كل الفصول، لذا الاصح هو أن نكتب كما يلي: $P(C|A_1)$ نفس الشيء بالنسبة لكل الصفوف،

$$P(C|A_1) \text{ الطلبة الذين ينتمون الى الجمعية وهم من الصف الاول, } \frac{1}{6}$$

$$P(C|A_2) \text{ الطلبة الذين ينتمون الى الجمعية وهم من الصف الثاني, } \frac{1}{4}$$

$$P(C|A_3) \text{ الطلبة الذين ينتمون الى الجمعية وهم من الصف الثالث, } \frac{1}{3}$$

ثانياً: تحديد المطلوب

إذا كان الطالب المختار عشوائياً عضو في الجمعية، فما احتمال أنه من الصف الأول،
نعبر عنها كما يلي:


$$P(A_1 | C) \text{ نكتب هنا الشرط أو نكتب المعلوم } C \text{ | نكتب هنا الاحتمال } A_1$$

ومنه المطلوب هو: $P(A_1|C)$

وحسب قانون الاحتمال الشرطي فان:

$$P(A_1|C) = \frac{P(A_1 \cap C)}{P(C)}$$

وكما قلنا حتى نفهم أكثر لابد من رسم الشجرة



من خلال الشجرة قد بينا كل ما هو مطلوب

نقصد بـ $P(A_1 \cap C)$ الطلبة الذين ينتمون إلى الصف الأول وهم يتبعون الجمعية وعبرنا

عليها في الرسم بالدائرة الأولى الملونة بالون الأزرق، أي:

$$P(A_1 \cap C) = P(A_1)P(C|A_1)$$

نقصد بـ $P(C)$ كل الطلبة الذين ينتمون للجمعية مهما كان صفهم وبالتالي هنا سنجمع كل من الطلبة الذين ينتمون للجمعية من الصف الأول مع الطلبة الذين ينتمون للجمعية من الصف الثاني مع الطلبة الذين ينتمون للجمعية من الصف الثالث، أي أن:

$$P(C) = P(A_1)P(C|A_1) + P(A_2)P(C|A_2) + P(A_3)P(C|A_3)$$

ومنه فإن:

$$P(A_1|C) = \frac{P(A_1 \cap C)}{P(C)} = \frac{P(A_1)P(C|A_1)}{P(A_1)P(C|A_1) + P(A_2)P(C|A_2) + P(A_3)P(C|A_3)}$$

وهذا ما سميناه سابقا قانون بايز وهو في الحقيقة يعتمد على مبدأ الاحتمال الجزئي على الاحتمال الكلي لذا لا بد من أن يكون المقام دائما جزء من البسط وإذا لم يكن كذلك فاعلم ان هناك خطأ ما والجاء هنا هو

$$P(A_1)P(C|A_1)$$

ومنه فإن:

$$P(A_1|C) = \frac{P(A_1)P(C|A_1)}{P(A_1)P(C|A_1) + P(A_2)P(C|A_2) + P(A_3)P(C|A_3)}$$

$$= \frac{\frac{1}{4} \times \frac{1}{6}}{\frac{1}{4} \times \frac{1}{6} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} + \frac{5}{12} \times \frac{1}{3}}$$

$$= \frac{3}{10}$$

تساؤل

قد يتساؤل الطالب هنا ويقول ماذا نفعل لو كان السؤال: ماهو احتمال أن يكون الطالب لاينتمي لاي جمعية وهو من الفصل الثاني

إذا كان السؤال هو: ماهو احتمال أن يكون الطالب لاينتمي لاي جمعية وهو من الفصل الثاني نعبر

عنه كما يلي: $P(A_2|\bar{C})$

$$P(A_2|\bar{C}) = \frac{P(A_2 \cap \bar{C})}{P(\bar{C})}$$

كما قلنا سابقا لابد للرجوع للمخطط حتى يسهل علينا إيجاد $P(A_2 \cap \bar{C})$ والتي نقصد بها أن يكون الطالب من الصف الثاني ولا ينتمي للجمعية/ أما $P(\bar{C})$ فنقصد بها أن يكون الطالب غير منتميا للجمعية بغض النظر عن الفصل أي من كل الفصول. ومنه فإن :

$$P(A_2|\bar{C}) = \frac{P(A_2 \cap \bar{C})}{P(\bar{C})} = \frac{P(A_2)P(\bar{C}|A_1)}{P(A_1)P(\bar{C}|A_1) + P(A_2)P(\bar{C}|A_2) + P(A_3)P(\bar{C}|A_3)}$$

نفس الملاحظة السابقة الاحتمال الجئي على الاحتمال الكلي والاحتمال الجئي يكون في البسط وفي

المقام وهو $P(A_2)P(\bar{C}|A_1)$

بالتعويض العددي نجد:

$$P(A_2|\bar{C}) = \frac{\frac{1}{3} \times \frac{3}{4}}{\frac{1}{4} \times \frac{5}{6} + \frac{1}{3} \times \frac{3}{4} + \frac{5}{12} \times \frac{2}{3}} = \frac{9}{53}$$

المتغيرات العشوائية والتوزيعات الاحتمالية

سبق وأن درسنا سابقا التجربة العشوائية وفراغ العينة والحدث واحتمالات حدوث هذه الاحتمالات في هذا القسم لن يكون اهتمامنا بدراسة نقاط فراغ العينة لكن سيكون اهتمامنا منصبا على قيم عددية مرتبطة بنقاط فراغ العينة هذه القيم العددية تسمى بالمتغير العشوائي، سندرس في هذا الفصل المتغيرات العشوائية وتوزيعاتها وتوقعاتها وتبايناتها سواء في الحالة المتقطعة أو في الحالة المتصلة، المصدر الأول للطالب الجزائري

المتغير العشوائي

Random Variable

يعرف المتغير العشوائي بصورة مبسطة على أنه دالة ذات قيم عددية حقيقية معرفة على فراغ العينة S ومجاله المقابل $X(s)$ هو مجموعة جزئية من مجموعة الأعداد الحقيقية وبصورة أكثر بساطة يمكن أن نعرف المتغير العشوائي بأنه المتغير الذي يمكن الحصول على قيمته نتيجة لتجربة عشوائية وينقسم إلى قسمية:

المتغير العشوائي المتقطع (المنفصل)

المتغير العشوائي المتصل (المستمر)

وستتم تناول كل منهما بالشرح والأمثلة كما يلي:

المتغير العشوائي المتقطع (المنفصل)

نقول أن المتغير العشوائي متقطع أو منفصل إذا كان يأخذ قيما تنتمي إلى مجموعة محدودة أو معدودة، أي يأخذ قيما منفصلة ومتباعدة عن بعضها البعض. ومن أمثلة المتغير العشوائي المتقطع عدد الصور التي تظهر عند رمي قطعة نقود n مرة، الرقم الذي يظهر عند رمي حجر النرد مرة أو أكثر عدد الوحدات المعيبة عند سحب عينة n من إنتاج إحدى الآلات.

مثال:

ألقيت قطعت نقود متزنة ثلاث مرات، أوجد القيم الممكنة للمتغيرات العشوائية التالية:

(أ) X عدد مرات ظهور الصورة،

(ب) Y مربع عدد مرات ظهور الصورة،

(أ) Z الفرق بين عدد مرات ظهور الصورة عدد مرات ظهور الكتابة.

أوجد مايلي:

$$P(X), \quad P(Y), \quad P(Z), \quad P(X > 1), \quad P(X \leq 1) \\ P(Y > 3), \quad P(20 \geq Y > 3) \\ P(Z > 10)$$

الحل:

فراغ العينة هو S :

$$S = \{HHH, HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH, TTT\}$$

(أ) المتغير العشوائي X قيمه الممكنة $X(s)$ هي:

$$X(s) = \{0, 1, 2, 3\}$$

فراغ العينة S	HHH	HHT	HTH	THH	HTT	THT	TTH	TTT
X	3	2	2	2	1	1	1	0


بمعنى انه يمكن أثناء الرمية ان يكون عدد ظهور الصورة هو صفر $\{TTT\}$ ويمكن أن تظهر الصورة

مرة واحدة خلال الرميات الثلاث $\{HTT, THT, TTH\}$ ، كما يمكن أن تظهر الصورة مرتين

$\{HHT, HTH, THH\}$ أي 2، ويمكن أن تظهر الصورة ثلاث مرات 3 كما يلي: $\{HHH\}$.

لذلك قلنا أن قيم المتغير العشوائي هي: $X(s) = \{0, 1, 2, 3\}$

ويمكن توضيح ذلك بالرسم التالي:



$$X(.TTT) = \{0\}$$

$$X(HTT) = \{1\}, X(THT) = \{1\}, X(TTH) = \{1\}$$

$$X(HHT) = \{2\}, X(HTH) = \{2\}, X(THH) = \{2\}$$

$$X(HHH) = \{3\}$$

أ) القيم الممكنة للمتغير العشوائي Y قيمه الممكنة $Y(s)$ هي:

لا بد من قراءة تعريف المتغير العشوائي جيدا حتى
يسهل علينا تحديد قيمه

المتغير العشوائي هو ضعف

القيم التي تعبر عن عدد الصور الممكنة ونحن قلنا سابقا:


$$Y(s) = \{0.1.4.9\}$$

بمعنى أنه يمكن أثناء الرمية أن يكون عدد ظهور الصورة هو صفر **0** $\{TTT\}$ وضعفه **0**

ويمكن أن تظهر الصورة مرة واحدة خلال الرميات الثلاث **1** $\{HTT.THT.TTH.\}$ وضعفه **1**

كما يمكن أن تظهر الصورة مرتين **2** أي $\{HHT.HTH.THH.\}$ وضعفه **4**

ويمكن أن تظهر الصورة ثلاث مرات **3** كما يلي: $\{HHH.\}$ وضعفه **9**




ومنه هنا فإن قيم المتغير العشوائي $Y(s)$ هي:

$$Y(s) = \{0.1.4.9\}$$

(ج) القيم الممكنة للمتغير العشوائي Z قيمه الممكنة $Z(s)$ هي:

المتغير العشوائي Z يعبر عن الفرق بين عدد مرات ظهور الصورة عدد مرات ظهور الكتابة بمعنى إذا ظهرت لدين صورتين وكتابة نقوم بطرح اثنين من واحد ونسجل النتيجة

عدد مرات ظهور الصورة **طرح** عدد مرات ظهور الصورة عدد مرات ظهور الصورة عدد مرات ظهور الكتابة



SAHLA MAHLA
المصدر الأول للطلاب الجزائري
من خلال طرح عدد مرات ظهور الصورة من عدد مرات ظهور الصورة نجد أن قيم $Z(s)$ هي:

$$Z(s) = \{3, 1, -1, -3\}$$

ولزيادة التوضيح:

$$Z(.TTT) = 0 - 3 = -3$$

$$Z(HTT) = 1 - 2 = -1, Z(THT) = 1 - 2 = -1, Z(TTH) = 1 - 2 = 1$$

$$Z(HHT) = 2 - 1 = 1, Z(HTH) = 2 - 1 = 1, Z(THH) = 2 - 1 = 1$$

$$Z(HHH) = 3 - 0 = 3$$

تابع التوزيع

Probability Distribution Function

ليكن X متغير عشوائي متقطع على فضاء العينة S مجموعة قيم منتهية من الشكل:

$$X(s) = \{x_1 . x_2 \dots \dots \dots x_n\}$$

أو غير منتهية من الشكل:

$$X(s) = \{x_1 . x_2 \dots \dots \dots\}$$

نسمي التابع التالي:

$$f_{x(X)} : X(s) \rightarrow R: x \rightarrow f_{x(X)} = P(X = x)$$

نعبر بـ $f(x)$ على تابع التوزيع أو تابع الكتلة الاحتمالية *Function Probability mass* للمتغير

العشوائي X

يحقق $f_{x(X)}$ التابع الخاصتين التاليتين:

$$\begin{aligned} 1) \quad & 0 \leq f_{x(X)} \leq 1 \\ 2) \quad & \sum_x f_{x(X)} = \sum_x P(X = x) = 1 \end{aligned}$$

في حالة عدم توفر أي خاصية من هاتين الخاصيتين لا يمكن أن نقول أننا أمام تابع الكتلة الاحتمالية أو ما يسمى دالة الكثافة.

وتأخذ دالة الكثافة للمتغير المتقطع الشكل التالي إذا عبرنا عنه بالجدول:

X	x_1	x_2	$\dots$	x_n
$P(X = x)$	$P(X = 1)$	$P(X = 2)$	$\dots$	$P(X = n)$

مثال (تكملة المثال السابق):

ألقيت قطعت نقود متزنة ثلاث مرات، أوجد القيم الممكنة للمتغيرات العشوائية التالية:

أ) X عدد مرات ظهور الصورة،

ب) Y مربع عدد مرات ظهور الصورة،

أ) Z الفرق بين عدد مرات ظهور الصورة عدد مرات ظهور الكتابة.

أوجد مايلي:

$$P(X), P(Y), P(Z)$$

يجب أن تعلم ان أي خطأ في تقدير قيم المتغير العشوائي معناه خطأ في حساب تابع التوزيع ونحن بالنسبة لهذا المثال كنا قد حددنا قيم المتغير العشوائي وفصلنا فيها حتى يفهمها الطالب

حساب تابع التوزيع $P(X)$ في المثال السابق:

نقصد بـ $P(X)$ هو قيمة الاحتمال عند كل قيم المتغير العشوائي X التي حدناها سابقا

$$X(s) = \{0, 1, 2, 3\}$$

فراغ العينة S	HHH	HHT	HTH	THH	HTT	THT	TTH	TTT	$\sum_x P(X=x)$
	3	2	2	2	1	1	1	0	
X	3	2	2	2	1	1	1	0	
$P(X=x)$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{3}{8}$	$\frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{3}{8}$	$\frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8} + \frac{3}{8} + \frac{3}{8} + \frac{1}{8} = 1$
	درسنا سابقا أن الاحتمال يساوي عدد الحالات الممكنة مقسوما على الحالات الكلية								إذا وجدنا أن المجموع لا يساوي واحد فهناك خطأ
	حيث نلاحظ أن عدد الحالات الكلية يساوي 8								

ويمكن تلخيص هذا الجدول بيانيا كما يلي:

$P(X=3)$ معناه هنا ما هو احتمال أن تظهر لدينا ثلاث صور وبما أن حالات ظهور ثلاث صور هي

حالة واحدة $\{HHH\}$ وبما أن الحالات الكلية هي ثمانية

$$S = \{HHH, HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH, TTT\}$$

$$P(X=3) = \frac{\text{الحالات الممكنة}}{\text{الحالات الكلية}} = \frac{1}{8} \text{ وبالتالي فإن:}$$

$P(X = 2)$ معناه ما هو احتمال أن تظهر لدينا صورتين وبما أن عدد حالات ظهور صورتين هو ثلاث

حالات $\{HHT, HTH, THH\}$ والحالات الكلية تساوي ثمانية 8

$$P(X = 2) = \frac{\text{الحالات الممكنة}}{\text{الحالات الكلية}} = \frac{3}{8}$$
 وبالتالي فإن:

$P(X = 1)$ معناه ما هو احتمال أن تظهر لدينا صورة واحدة وبما أن عدد حالات ظهور صورة واحدة

هو ثلاث حالات $\{HTT, THT, TTH\}$ والحالات الكلية تساوي ثمانية 8


$$P(X = 1) = \frac{\text{الحالات الممكنة}}{\text{الحالات الكلية}} = \frac{3}{8}$$
 وبالتالي فإن:

$P(X = 0)$ معناه ما هو احتمال أن لا تظهر لدينا أي صورة وبما أن عدد حالات عدم ظهور أي صورة

هو حالة واحدة $\{TTT\}$ والحالات الكلية تساوي ثمانية 8

$$P(X = 0) = \frac{\text{الحالات الممكنة}}{\text{الحالات الكلية}} = \frac{1}{8}$$
 وبالتالي فإن:

ويمكن التعبير عن تابع التوزيع بالرسم البياني كما يلي:



حساب تابع التوزيع $P(Y)$ في المثال السابق:

نقصد بـ $P(Y)$ هو قيمة الاحتمال عند كل قيم المتغير العشوائي Y التي حدناها سابقا

$$y(s) = \{0^2, 1^2, 2^2, 3^2\} = \{0, 1, 4, 9\}$$

Y	0^2	1^2	2^2	3^2	$\sum_x P(Y = y)$
$P(Y = y)$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{3}{8}$	$\frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8} + \frac{3}{8} + \frac{3}{8} + \frac{1}{8} = 1$

أذا وجدنا أن المجموع لا يساوي واحد فهناك خطأ	درسنا سابقا أن الاحتمال يساوي عدد الحالات الممكنة مقسوما على الحالات الكلية حيث نلاحظ أن عدد الحالات الكلية يساوي 8
--	---

ويمكن تلخيص هذا الجدول بيانيا كما يلي:

$P(y = 3^2 = 9)$ معناه هنا ليس ظهور تسعة صور وهو مستحيل في ثلاث رميات، بل المعنى هنا هو مربع عدد الصور التي تظهر ونحن ظهرت لدينا ثلاث صور وبالتالي مربعها هو تسعة ومن نحسب احتمال ظهور ثلاث صور، وبما أن حالات ظهور ثلاث صور هي حالة واحدة $\{HHH\}$ وبما أن الحالات الكلية هي ثمانية

$$S = \{HHH, HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH, TTT\}$$

$$P(y = 3^2 = 9) = \frac{\text{الحالات الممكنة}}{\text{الحالات الكلية}} = \frac{1}{8}$$
 وبالتالي فإن:

$P(y = 2^2 = 4)$ معناه هنا ليس ظهور أربع صور وهو مستحيل في ثلاث رميات، بل المعنى هنا هو مربع عدد الصور التي تظهر ونحن ظهرت لدينا صورتين وبالتالي مربعها هو أربعة ومن ثم نحسب احتمال ظهور صورتين ،

$$P(y = 2^2 = 4) = \frac{\text{الحالات الممكنة}}{\text{الحالات الكلية}} = \frac{3}{8}$$
 وبالتالي فإن:

$P(y = 1^2 = 1)$ معناه ما هو احتمال أن تظهر لدينا صورة واحدة وبما أن عدد حالات ظهور صورة واحدة هو ثلاث حالات $\{HTT, THT, TTH\}$ والحالات الكلية تساوي ثمانية 8


$$P(X = 1) = \frac{\text{الحالات الممكنة}}{\text{الحالات الكلية}} = \frac{3}{8}$$
 وبالتالي فإن:

$P(y = 0^2 = 0)$ معناه ما هو احتمال أن لا تظهر لدينا أي صورة وبما أن عدد حالات عدم ظهور

أي صورة هو حالة واحدة $\{TTT\}$ والحالات الكلية تساوي ثمانية 8

$$P(y = 0^2 = 0) = \frac{\text{الحالات الممكنة}}{\text{الحالات الكلية}} = \frac{1}{8}$$
 وبالتالي فإن:

ويمكن التعبير عن تابع التوزيع $P(y)$ بالرسم البياني كما يلي:



حساب تابع التوزيع $P(Z)$ في المثال السابق:

حسب تعريف المتغير العشوائي Z الذي يعرف المتغير العشوائي Z بأنه طرح عدد مرات ظهور الصورة من عدد مرات ظهور الصورة

من خلال طرح عدد مرات ظهور الصورة من عدد مرات ظهور الصورة نجد أن قيم $Z(s)$ هي:

$$Z(.TTT) = 0 - 3 = -3$$

$$Z(HTT) = 1 - 2 = -1, Z(THT) = 1 - 2 = -1, Z(TTH) = 1 - 2 = 1$$


$$Z(HHT) = 2 - 1 = 1, Z(HTH) = 2 - 1 = 1, Z(THH) = 2 - 1 = 1$$

$$Z(HHH) = 3 - 0 = 3$$

$$Z(s) = \{3, 1, -1, -3\}$$

Z	-3	-1	1	3	$\sum_x P(Y = y)$
$P(Z = z)$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{3}{8}$	$\frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8} + \frac{3}{8} + \frac{3}{8} + \frac{1}{8} = 1$
	درسنا سابقاً أن الاحتمال يساوي عدد الحالات الممكنة مقسوماً على الحالات الكلية حيث نلاحظ أن عدد الحالات الكلية يساوي 8				إذا وجدنا أن المجموع لا يساوي واحد فهناك خطأ

ويمكن التعبير عن تابع التوزيع $P(z)$ بالرسم البياني كما يلي:



دالة التوزيع

Cumulative Distribution Function

نعرف تابع التوزيع التراكمي $F_{X(x)}$ (اختصارا $F(x)$) لمتغير عشوائي X له تابع التوزيع

الاحتمالي كما يلي:

$$F_{X(x)} = P(X \leq x) = \sum_{t \leq x} f_{X(t)} ; x \in R$$

وللتوضيح أكثر فإن دالة التوزيع هي القيم التراكمية لقيم تابع التوزيع أي كل قيمة نجمعها مع التي تليها ثم نجمع المجموع مع الذي يليه وفي القيمة الأخيرة نجد أن دالة التوزيع تساوي الواحد

الفرق في رمز تابع التوزيع ودالة التوزيع هو أن حرف

f تكتب صغيرة عندما نقصد تابع التوزيع

F تكتب كبيرة عندما نقصد دالة التوزيع

حساب دالة التوزيع $F(x)$ في المثال السابق:

نقصد بـ $F(X)$ هو القيمة التراكمية

لتابع التوزيع $f_{X(X)} = P(X = x)$

حساب دالة التوزيع يعتمد

على صحة تابع التوزيع فان

كانت صحيحة صح حسابك

لدالة التوزيع والعكس

X	0	1	2	3	$\sum_x P(Y = y)$
$P(X = x)$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$	1
$F(x)$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8} + \frac{3}{8} = \frac{4}{8}$	$\frac{1}{8} + \frac{3}{8} + \frac{3}{8} = \frac{7}{8}$	$\frac{1}{8} + \frac{3}{8} + \frac{3}{8} + \frac{1}{8} = 1$	
	لاحظ أن كل قيمة لدالة التوزيع عبارة عن مجموع قيم تابع التوزيع التي سبقتها				إذا وجدنا أن المجموع لا يساوي واحد فهناك خطأ

ويمكن أن نعبر عن دالة التوزيع كما يلي:

$$F_{X(x)} = P(X \leq x)$$

$$F_{X(0)} = P(X \leq 0) = P(X = 0) = \frac{1}{8}$$

$$F_{X(1)} = P(X \leq 1) = P(X = 0) + P(X = 1) = \frac{4}{8}$$

$$F_{X(2)} = P(X \leq 2) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) = \frac{7}{8}$$


$$F_{X(3)} = P(X \leq 3) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) = \frac{8}{8}$$

بالنسبة للطالب التعبير عن

دالة التوزيع في الجدول يكون

أسهل

ويمكن التعبير عن دالة التوزيع $F(x)$ بيانيا كما يلي:



SAHLA MAHLA


المصدر الأصلي للطالب الجزائري

تساؤل: قد يسأل الطالب هنا ما هو الفرق بين دالة التوزيع وتابع التوزيع:

تابع التوزيع يعطينا الاحتمال عند نقطة معينة أما دالة التوزيع فتعطينا الاحتمال عند مجال

مثلا لو طلب من حساب $F_{X(-1)}$ $F_{X(10)}$ $F_{X(1)}$

حتى يسهل علينا حساب $F_{X(-1)}$ $F_{X(10)}$ $F_{X(1)}$ يمكننا أن نستعين بالرسم التالي:



قيمة دالة التوزيع تكون الصفر من ناقص ما لا نهاية إلى صفر أي:

$F(x < 3) = 0$

في هذا المجال قيمة دالة التوزيع تساوي الواحد

$F(0 \leq x < 3) = 1$

قيمة دالة التوزيع تكون واحد بعد الثلاثة أي:

$F(x \geq 3) = 1$

حساب دالة التوزيع $F(y)$ في المثال السابق:

بما أن تابع التوزيع تم حسابه سابق فان دالة التوزيع ستكون سهلة جدا

سوف نتبع نفس الخطوات التي قمنا بها في حساب دالة التوزيع للمتغير

X

Y	0	1	4	9	$\sum_x P(Y = y)$
$P(Y = y)$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$	1
$F(y)$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8} + \frac{3}{8} = \frac{4}{8}$	$\frac{1}{8} + \frac{3}{8} + \frac{3}{8} = \frac{7}{8}$	$\frac{1}{8} + \frac{3}{8} + \frac{3}{8} + \frac{1}{8} = 1$	
	لاحظ أن كل قيمة لدالة التوزيع عبارة عن مجموع قيم تابع التوزيع التي سبقتها				إذا وجدنا أن المجموع لا يساوي واحد فهناك خطأ

لن نعبر عنها هنا بالرسم لأنه نفس الرسم لدالة التوزيع $F(x)$

حساب دالة التوزيع $F(z)$ في المثال السابق:


بما أن تابع التوزيع تم حسابه سابق فإن دالة التوزيع ستكون سهلة جدا

Z	-3	-1	1	3	$\sum_x P(Y=y)$
$P(Z=z)$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$	1
$F(z)$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8} + \frac{3}{8} = \frac{4}{8}$	$\frac{4}{8} + \frac{3}{8} = \frac{7}{8}$	$\frac{7}{8} + \frac{1}{8} = 1$	


ويمكن أن نعبر عن دالة التوزيع كما يلي:

$$F(z) = \begin{cases} F_{Z(y)} = P(Z \leq y) \\ F_{Z(-3)} = P(Z \leq -3) = P(Z = -3) = \frac{1}{8} \\ F_{Z(-1)} = P(Z \leq -1) = P(Z = -3) + P(Z = -1) = \frac{4}{8} \\ F_{Z(0)} = P(Z \leq 2) = P(Z = -3) + P(Z = -1) + P(Z = 0) = \frac{7}{8} \\ F_{Z(3)} = P(Z \leq 3) = P(Z = -3) + P(Z = -1) + P(Z = 0) + P(Z = 3) = \frac{8}{8} \end{cases}$$

ويمكن التعبير عن دالة التوزيع $F(z)$ بيانيا كما يلي:



أحسب: $F_Z(-1)$ $F_Z(-5)$ $F_Z(5)$
 حتى يسهل علينا حساب $F_Z(-1)$ $F_Z(-5)$ $F_Z(5)$ يمكننا أن نستعين بالرسم التالي:



التوقع الرياضي والانحراف المعياري

Mathematical Expectation

التوقع الرياضي: يعرف التوقع الرياضي والقيمة المتوقعة على أساس أنه المتوسط المرجح لكل قيم المتغير العشوائي، حيث ترجح كل قيمة من المتغير باحتمالها فإذا كان X متغيراً عشوائياً له دالة توزيع فان التوقع أو القيمة المتوقعة للمتغير X والذي يرمز له بالرمز $E(X)$ ، ويعرف حسب العلاقة التالية:

$$E(X) = x_1 f(x_1) + x_2 f(x_2) + \dots \dots \dots x_n f(x_n) = \sum_{i=1}^n x_i f(x_i)$$

القيم المتوقعة لتوزيع احتمالي متقطع

$$E(X) = \sum_{i=1}^n x_i p(x_i) = \mu_X$$

μ_X أو $E(X)$ القيمة المتوقعة لـ X ، X قيم المتغير العشوائي ، احتمال أن يأخذ المتغير العشوائي القيمة X

ملاحظة: نطلق على التوقع الرياضي أيضا الامل الرياضي أي ما نأمل الحصول عليه وهي نفس تفسير ما نتوقع الحصول عليه: كما ان التوقع الرياضي نقصد به القيمة المتوسطة وهو يقابل الوسط الحسابي في الاحصاء الوصفي ويمكن اثبات ذلك كما يلي:

نفرض أن لدينا احتمالات متساوية مثل زهرة نرد متوازنة كل الارقام لها نفس الاحتمال أي:

$$P(x) = \frac{1}{n} \quad \forall x \in \{x_1, x_1, x_1, \dots, x_n\}$$

$$\mu_X = E(X) = \sum_{i=1}^n x_i p(x_i) = x_1 \frac{1}{n} + x_2 \frac{1}{n} + x_3 \frac{1}{n} + \dots + x_n \frac{1}{n}$$

$$= \frac{1}{n} (x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n)$$

$$= \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

نلاحظ أن التوقع الرياضي يساوي $\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$ وهو هنا يمثل مجموع القيم مقسوما على عدد القيم وهو تعريف الوسط الحسابي الذي تم دراسته في الاحصاء الوصفي، أليك بعض النظريات التي تساعدنا في حساب التوقع الرياضي: توقع العدد الثابت هو نفسه أي:

نفرض C عدد ثابت فإن:

أولا:

$$a) \quad E(c) = c$$

البرهان

$$E(c) = \sum_{i=1}^n c p(c) = c \sum_{i=1}^n p(c)$$

وبما أن مجموع الاحتمالات دائما يساوي الواحد فإن $\sum_{i=1}^n p(c) = 1$

$$= c \sum_{i=1}^n p(c) = c$$

ثانيا:

$$b) \quad E(cX) = cE(X)$$

البرهان

$$E(cX) = \sum_{i=1}^n c x_i p(x_i) = c x_1 p(x_1) + c x_2 p(x_2) + \dots + c x_n p(x_n)$$

$$= c (x_1 p(x_1) + x_2 p(x_2) + \dots + x_n p(x_n))$$

$$= c \sum_{i=1}^n x_i p(x_i) = cE(X)$$

إذا كان لدينا متغيرين عشوائيين فإن:

$$E(X \pm Y) = E(X) \pm E(Y)$$

البرهان:

$$\begin{aligned} E(X \pm Y) &= \sum_{i=1}^n (x_i \pm y_i) p(x_i \pm y_i) = \\ &= (x_1 p(x_1) \pm y_1 p(y_1) \pm x_2 p(x_2) \pm y_2 p(y_2) \pm \dots \pm x_n p(x_n) \pm y_n p(y_n)) \\ &= (x_1 p(x_1) \pm x_2 p(x_2) \pm \dots \pm x_n p(x_n)) \pm (y_1 p(y_1) \pm y_2 p(y_2) \pm \dots \pm y_n p(y_n)) \\ &\quad \underbrace{\hspace{10em}}_{E(X)} \quad \underbrace{\hspace{10em}}_{E(Y)} \\ &\quad \underbrace{\hspace{10em}}_{E(X) \pm E(Y)} \\ E(X \pm Y) &= E(X) \pm E(Y) \end{aligned}$$

$$E(aX \pm bY) = aE(X) \pm bE(Y)$$

$$E(X \pm a) = E(X) \pm a$$

$$E(aX \pm b) = aE(X) \pm b$$

$$E(XY) = E(X)E(Y)$$

$$E(aXY) = aE(X)E(Y)$$

$$E(E(X)) = E(X)$$

إذا كان X و Y متغيرين عشوائيين مستقلين، فإن:

$$E(XY) = E(X)E(Y)$$

البرهان:

بما أن المتغيرين مستقلين فإن $p(xy) = p(x)p(y)$

$$E(XY) = \sum_{i=1}^n (x_i y_i) p(x_i y_i) = \sum_{i=1}^n (x_i y_i) p(x_i) p(y_i) = \sum_{i=1}^n x_i p(x_i) y_i p(y_i) = E(X)E(Y)$$

الانحراف المعياري: يقيس الانحراف المعياري الإنتشار أو التشتت لمجموعة من البيانات، وكذلك يقيس الانحراف المعياري إنتشار قيم المتغير العشوائي،

لحساب التباين والانحراف المعياري لتوزيع احتمالي متقطع

التباين يرمز له بـ $Var(X)$ ويساوي

$$Var(X) = \sigma_X^2 = E(X^2) - [E(X)]^2$$

الانحراف المعياري يرمز له بـ σ_X ويساوي

$$\sigma_X = \sqrt{Var(X)} = \sqrt{E(X^2) - [E(X)]^2}$$

للتوضيح فإن $E(X^2)$ يحسب كما يلي:

$$E(X^2) = \sum_{i=1}^n x_i^2 p(x_i)$$

إذا كان متغيرا عشوائيا و C عدد ثابت فإن:

$$a) \quad Var(c) = 0$$

البرهان

$$Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 \rightarrow Var(c) = E(c^2) - [E(c)]^2$$

$$E(c^2) = ?$$

$$\begin{aligned} E(c^2) &= \sum_{i=1}^n c c p(cc) = \sum_{i=1}^n c c p(c) p(c) = \sum_{i=1}^n [c p(c)] [c p(c)] \\ &= \sum_{i=1}^n [c p(c)] \sum_{i=1}^n [c p(c)] = E(c) E(c) = [E(c)]^2 \end{aligned}$$

ملاحظة جد مهم يجب الانتباه عليها كي لا يخلط الطالب بين الثابت والمتغير

$$E(c^2) = [E(c)]^2 \quad \text{هذا في حالة الثابت } c$$

$$E(X^2) \neq [E(X)]^2 \quad \text{هذا في حالة المتغير } X$$

$$Var(c) = E(c^2) - [E(c)]^2 = 0$$

ثانياً:

$$b) \quad Var(cX) = c^2 Var(X)$$

البرهان

البرهان

$$Var(cX) = c^2 Var(X) \rightarrow Var(c) = E(cX^2) - [E(cX)]^2$$

لدينا حسب خواص الموقع أن: $E(cX) = cE(X)$

$$E(cX) = cE(X) \rightarrow [E(cX)]^2 = c^2 [E(X)]^2$$

$$E((cX)^2) = E(c^2 X^2) = c^2 E(X^2) \rightarrow Var(cX) = c^2 E(X^2) - c^2 [E(X)]^2 \\ = c^2 [E(X^2) - [E(X)]^2] = c^2 Var(X)$$

إذا كان X و Y متغيرين عشوائيين مستقلين، فإن: $Var(X \pm Y) = Var(X) + Var(Y)$

$$Var(X - Y) = E((X - Y)^2) - [E(X - Y)]^2$$

$$E((X - Y)^2) = E(X^2 + Y^2 - XY)$$

$$= E(X^2) + E(Y^2) - 2E(XY)$$

$$= E(X^2) + E(Y^2) - 2E(XY)$$

$$[E(X - Y)]^2 = [E(X) - E(Y)]^2$$

$$= [E(X)]^2 + [E(Y)]^2 - 2E(X)E(Y)$$

$$Var(X - Y) = E(X^2) + E(Y^2) - 2E(XY) - [E(X)]^2 - [E(Y)]^2 + 2E(X)E(Y)$$

$$= E(X^2) + E(Y^2) - 2E(X)E(Y) - [E(X)]^2 - [E(Y)]^2 + 2E(X)E(Y)$$

$$= E(X^2) + E(Y^2) - [E(X)]^2 - [E(Y)]^2$$

$$= [E(X^2) - [E(X)]^2] + [E(Y^2) - [E(Y)]^2]$$

$$Var(X)$$

+

$$Var(Y)$$

$$Var(X - Y) = Var(X) + Var(Y)$$

إذا كان X و Y متغيرين عشوائيين مستقلين، فإن: $Var(X \pm Y) = Var(X) + Var(Y)$

$$Var(X \pm Y) = E((X \pm Y)^2) - [E(X \pm Y)]^2$$

$$\begin{aligned} E((X \pm Y)^2) &= E(X^2 + Y^2 \pm 2XY) \\ &= E(X^2) + E(Y^2) \pm 2E(XY) \\ &= E(X^2) + E(Y^2) \pm 2E(X)E(Y) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [E(X \pm Y)]^2 &= [E(X) \pm E(Y)]^2 \\ &= [E(X)]^2 + [E(Y)]^2 \pm 2E(X)E(Y) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Var(X \pm Y) &= E(X^2) + E(Y^2) \pm 2E(XY) - [E(X)]^2 - [E(Y)]^2 \pm 2E(X)E(Y) \\ &= E(X^2) + E(Y^2) \pm 2E(X)E(Y) - [E(X)]^2 - [E(Y)]^2 \pm 2E(X)E(Y) \\ &= E(X^2) + E(Y^2) - [E(X)]^2 - [E(Y)]^2 \\ &= \underbrace{E(X^2) - [E(X)]^2}_{Var(X)} + \underbrace{E(Y^2) - [E(Y)]^2}_{Var(Y)} \end{aligned}$$

$$Var(X \pm Y) = Var(X) + Var(Y)$$

$$\begin{aligned} Var(X \pm Y) &= Var(X) + Var(Y) \\ Var(X \mp Y) &= Var(X) + Var(Y) \end{aligned}$$

مثال:

ليكن X متغير عشوائي القيم الاحتمالية له ممثلة في الجدول التالي:

X	0	1	2	3
$P(X = x)$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	α	$\frac{1}{8}$

أوجد كل من:

α

a) $E(X)$; b) $E(X^2)$; c) $E(X+7)$; d) $E(X^2 + 3X)$

e) $Var(X)$; f) $Var(6X - 8)$; g) $Var(X^2 - 2)$; h) $Var(X)$

الحل:

باستخدام ما تم دراسته سابقا:

$$\sum_x P(X = x) = 1 \rightarrow P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) = 1$$

$$\frac{1}{8} + \frac{3}{8} + \alpha + \frac{1}{8} = 1 \rightarrow \alpha + \frac{5}{8} = 1 \rightarrow \alpha = 1 - \frac{5}{8}$$

$$\alpha = \frac{3}{8}$$

ومنه:

X	0	1	2	3
$P(X = x)$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\alpha = \frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$

حساب التوقع الرياضي: $E(X)$

$$E(X) = \sum_{i=1}^n x_i p(x_i)$$

X^2	0	1	4	9	
X	0	1	2	3	المجموع
$P(X = x)$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$	1
$x_i p(x_i)$	$0 \times \frac{1}{8}$	$1 \times \frac{3}{8}$	$2 \times \frac{3}{8}$	$3 \times \frac{1}{8}$	$\frac{12}{8}$
$X^2_i p(X^2_i)$	$0 \times \frac{1}{8}$	$1 \times \frac{3}{8}$	$4 \times \frac{3}{8}$	$9 \times \frac{1}{8}$	$\frac{24}{8}$
$(X^2 + 3X)_i p(X_i)$	$(0^2 + 3 \times 0) \frac{1}{8}$	$(1^2 + 3 \times 1) \frac{3}{8}$	$(2^2 + 3 \times 2) \frac{3}{8}$	$(3^2 + 3 \times 3) \frac{1}{8}$	$\frac{60}{8}$

من خلال الجدول نجد:

$$E(X) = \sum_{i=1}^n x_i p(x_i) = \frac{12}{8}$$

أو

$$E(X) = 0 \times \frac{1}{8} + 1 \times \frac{3}{8} + 2 \times \frac{3}{8} + 3 \times \frac{1}{8} = \frac{12}{8}$$

حساب: $E((X)^2)$

$$E(X^2) = \sum_{i=1}^n X^2_i p(X^2_i)$$

من خلال الجدول نجد:

$$E(X^2) = \sum_{i=1}^n X_i^2 p(X_i) = \frac{24}{8}$$

أو

$$E(X^2) = 0 \times \frac{1}{8} + 1 \times \frac{3}{8} + 4 \times \frac{3}{8} + 9 \times \frac{1}{8} = \frac{24}{8}$$

c) حساب $E(X+7)$:

حسب الخاصية التي درسناها:

$$E(X+a) = E(X) + a \rightarrow E(X+7) = E(X) + 7 = \frac{10}{8} + 7 = \frac{66}{8}$$

d) حساب $E(X^2 + 3X)$:

حسب الخاصية التي درسناها:

$$E(X^2 + 3X) = E(X^2) + E(3X) = E(X^2) + 3E(X) = \frac{24}{8} + 3\left(\frac{12}{8}\right) = \frac{60}{8}$$

أو بطريقة أخرى

$$E(X^2 + 3X) = \sum_{i=1}^n (X_i^2 + 3X_i) p(X_i)$$

$$= (0^2 + 3 \times 0)0 + (1^2 + 3 \times 1)\frac{12}{8} + (2^2 + 3 \times 2)\frac{30}{8} + (3^2 + 3 \times 3)\frac{18}{8}$$

$$= \frac{60}{8}$$

e) حساب التباين: $Var(X)$

لطلاب الجزائري

$$Var(X) = \sigma_X^2 = E(X^2) - [E(X)]^2$$

بما اننا سابق وجدنا أن:

$$E(X^2) = \frac{24}{8} ; E(X) = \frac{12}{8} \rightarrow [E(X)]^2 = \frac{144}{64} \rightarrow Var(X) = \frac{24}{8} - \frac{144}{64}$$

$$Var(X) = \frac{432}{64} = 6.75$$

f) حساب $Var(6X-8)$

حسب الخاصية التي درسناها:

$$Var(6X-8) = 6^2 Var(X)$$

$$Var(6X-8) = 6^2(6.75) = 243$$

مثال:

ليكت لدينا متغيرين عشوائيين لهما تابع التوزيع الاحتمالي المشترك كما هو مبين في الجدول التالي:

X/Y	$X = 0$	$X = 1$	$X = 2$	المجموع
$Y = 0$	$\frac{3}{28}$	$\frac{3}{14}$	$\frac{1}{28}$	$\frac{5}{14}$
$Y = 1$	$\frac{9}{28}$	$\frac{3}{14}$	0	$\frac{15}{28}$
$Y = 2$	$\frac{3}{28}$	0	0	$\frac{3}{28}$
المجموع	$\frac{15}{28}$	$\frac{3}{7}$	$\frac{1}{28}$	1

في هذا المثال هل $E(XY) = E(X)E(Y)$ أو $E(XY) \neq E(X)E(Y)$ ولماذا؟

الحل:

أولا حساب $E(XY)$

$$\begin{aligned}
 E(XY) &= \sum_{x=0}^2 \sum_{y=0}^2 xy f_{x,y}(x, y) = 0 \times 0 \times \left(\frac{3}{28}\right) + 0 \times 1 \times \left(\frac{9}{28}\right) + 0 \\
 &\quad \times 2 \times \left(\frac{3}{28}\right) + 1 \times 0 \times \left(\frac{3}{14}\right) + 1 \times 1 \times \left(\frac{3}{14}\right) + 2 \times 1 \times (0) \\
 &\quad + 2 \times 0 \times \left(\frac{1}{28}\right) + 2 \times 1 \times (0) + 2 \times 2 \times (0) \\
 &= 1 \times 1 \times \left(\frac{3}{14}\right) = \frac{3}{14}
 \end{aligned}$$

ثانيا: حساب $E(X)E(Y)$

$$\begin{aligned}
 E(y) &= \sum_{x=0}^2 y f_y(y) = 0 \times \left(\frac{15}{28}\right) + 1 \times \left(\frac{3}{7}\right) + 2 \times \left(\frac{1}{28}\right) = \frac{14}{28} = \frac{1}{2} \\
 E(x) &= \sum_{x=0}^2 x f_x(x) = 0 \times \left(\frac{5}{14}\right) + 1 \times \left(\frac{15}{28}\right) + 2 \times \left(\frac{3}{28}\right) = \frac{21}{28} = \frac{3}{4}
 \end{aligned}$$

ومنه:

$$E(X)E(Y) = \frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{8}$$

$$E(XY) \neq E(X)E(Y)$$

$$\frac{3}{14} \neq \frac{3}{8}$$

نلاحظ أن

$$E(XY) \neq E(X)E(Y)$$

وذلك لانهم غير مستقلان بل مرتبطان

المتغير العشوائي المستمر (المتصل)

Continuous Probability Distributions

المتغير العشوائي المستمر هو متغير عشوائي يمكن أن يأخذ عددا غير منتهيا . ويتحدد هذا المتغير العشوائي من خلال مجال معين قد يكون هذا المجال مفتوحاً أو شبه مفتوح أو مغلق، وقد تكون محددة أو غير محدودة. أي أن له قيم فترية مستمرة وليست متقطعة .، فمثلا عند قياس الوزن لمجموعة من الطلبة فهناك مجال محدد لكن قيمه ليست منتهية ولا يمكن عدّها ، وتبين دالة توزيع المتغير العشوائي المستمر كيفية حساب القيم الاحتمالية والمعرفة على مجال القيم التي يأخذها هذا المتغير العشوائي.

وكما قلنا بأن قيم المتغير العشوائي المستمر لا حصر لها فإنه لا يمكننا تحديد احتمال كل نتيجة عن طريق جدول كما هو الحال بالنسبة للمتغير العشوائي المتقطع، بل يتم تقديم دالة جديدة تستخدم لحساب الاحتمالات. تسمى دالة كثافة لنفرض أننا نهتم بدراسة أوزان مجموعة من الطلبة، من أجل أي قيمتين 52,5 كلغ و 70,5 كلغ على سبيل المثال، فإنه يوجد عدد غير منته بين أقل وزن وأكثر وزن، كما أن اختيار طالب وزنه 70 كلغ تماما أمر شبه مستحيل ويمكن القول بأن احتمال يساوي الصفر، إلا أن الامر يختلف إذا كنا نريد أن نبحث عن احتمال اختيار طالب وزنه على الاقل 70 كلغ وبما أنه لا يتجاوز 70,5 كلغ فإنه سيتم في هذه الحالة التعامل مع مجال بدلا من التعامل مع نقاط أي أننا نقوم بحساب الاحتمال بالشكل: $P(a < X < b)$ ، $P(a < X)$ على سبيل المثال،

ملاحظة

الاحتمال في المتغير العشوائي يحسب لمجل معين ويون دائما يساوا الصفر عند نقطة معينة

$$P(X = a) = 0$$

فلا يمكن تحديد جدول احتمال في المتغير المتصل كما في المتغير المتقطع

ومع أن المتغير العشوائي مستمرا يمكن أن يكون أي عدد حقيقي؛ على المجال $X \in [a; b]$

2. شروط دالة كثافة الاحتمال

بفرض أن X متغير عشوائي متصل معرف على فضاء العينة S ولكن مجال تعريفه هو

$$f: [-\infty; +\infty] \rightarrow [0; 1] \quad \text{حيث يمثل هذا المجال:}$$

فإن هناك شرطان لتكون دالة التوزيع الاحتمالية المستمرة لـ $[-\infty; +\infty]$ دالة كثافة احتمال وهما:

$$\text{شروط دالة الكثافة} = \begin{cases} 1) \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1 \\ 2) f(x) \geq 0; \quad \forall x \in [-\infty; +\infty] \rightarrow 1 \geq f(x) \geq 0 \end{cases}$$

ويمكن أن يأخذ المتغير العشوائي X قيمة في الفترة $[a; b]$ فيعبر عنه:

$$P(a < X < b) = \int_a^b f(x) dx$$

والمخطط التالي يوضح ما سبق



الدالة ليست معرفة في هذا المجال من $[-\infty; a]$ وبالتالي قيمة الاحتمال هنا تساوي الصفر

$$P(a < X < -\infty) = \int_{-\infty}^a f(x) dx = 0$$

الدالة معرفة في هذا المجال أي أن أي قيمة للمتغير العشوائي داخل هذا المجال يقابلها قيمة احتمالية محصورة بين الصفر والواحد، وقيمة الاحتمال المحصور في هذا المجال تساوي الواحد

$$P(a < X < b) = \int_a^b f(x) dx = 1$$

الدالة ليست معرفة في هذا المجال من $[b; +\infty]$ وبالتالي قيمة الاحتمال هنا تساوي الصفر

$$P(a < X < +\infty) = \int_b^{+\infty} f(x) dx = 0$$

ملاحظة

وبما أن الاحتمال في حالة المتغير العشوائي المستمر يعبر عنه بالمساحة فإن:

$$P(a < X < b) = P(a \leq X < b) = P(a < X \leq b) = P(a \leq X \leq b)$$

هنا يجب أن ننوه إلى أن الطالب يحتاج إلى دراسة الدوال الأصلية والتكامل والا فلن يكون قادرا على دراسة هذا الفصل

مثال:

بين أن $f(x)$ يمثل دالة احتمالية للمتغير العشوائي X ثم احسب

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{9}x^2; & 0 < x < 3 \\ 0 & \text{عدا ذلك} \end{cases}$$

ملاحظة نقصد بكلمة عدا ذلك أن عدا المجال المميز

$$0 < x < 3$$

فإن الاحتمال يساوي الصفر

أولاً: $P(x = 1)$, $P(x = 3)$, $P(x \leq 7)$, $P(x \geq -3)$

$$P(1 < X < 3)$$

ثانياً: $P(2 < X < 7)$

ثالثاً: أثبت أن $f(x)$ تمثل دالة كثافة

الحل:

قبل الحل هنا لا بد أولاً من تحديد المجال والتركيز معه لأنه إذ استبعد مجال السؤال من هذا المجال كانت النتيجة صفر

$$x \in [0, 3]$$

أولاً: حساب كل من:

$$P(x = 1) , P(x = 3) ;$$

$$P(x \leq 7) , P(x \geq -3)$$

المخطط التالي يوضح كيف يتم حساب الاحتمال المحصور في مجال:

$x \geq -3$ تنتمي الى المجال التالي $[-3; +\infty[\rightarrow P(-3 < X < +\infty)$ وهذا المجال ينقسم إلى ثلاث مجالات كالتالي:

المجال الأول: $[-3; 0[$ وهذا المجال الدالة فيه ليست معرفة وبالتالي الاحتمال هنا يساوي الصفر

$$P(-3 < X < 0) = \int_{-3}^0 f(x) dx = 0$$


المجال الثاني: $[0, 3]$ وهذا المجال هو مجال تعريف دالة الاحتمال وبالتالي فلاحتمال في هذا المجال يساوي الواحد

$$P(0 < X < 3) = \int_0^3 \frac{1}{9} x^2 dx = 1$$

المجال الثالث: $]3; +\infty[$ وهذا المجال الدالة فيه ليست معرفة وبالتالي الاحتمال هنا يساوي الصفر

$$P(3 < X < +\infty) = \int_3^{+\infty} f(x) dx = 0$$

ومنه فإن: $P(-3 < X < +\infty) = 1$



الدالة ليست معرفة في هذا المجال من $]-\infty; 0]$ وبالتالي قيمة الاحتمال هنا تساوي الصفر

$$P(-\infty < X < 0) = \int_{-\infty}^0 f(x) dx = 0$$

الدالة معرفة في هذا المجال أي أن أي قيمة للمتغير العشوائي داخل هذا المجال يقابلها قيمة احتمالية محصورة بين الصفر والثلاثة، وقيمة الاحتمال المحصور في هذا المجال تساوي الواحد

$$P(0 < X < 3) = \int_0^3 \frac{1}{9} x^2 dx = 1$$

الدالة ليست معرفة في هذا المجال من $]3; +\infty[$ وبالتالي قيمة الاحتمال هنا تساوي الصفر

$$P(3 < X < +\infty) = \int_3^{+\infty} f(x) dx = 0$$

$$P(x = 1) , P(x = 3)$$

لاحظ أن المطلوب هنا هو حساب الاحتمال عند نقطة وقد بينا سابقا ان قيمة الاحتمال عند نقطة في المتغير المتصل تكون دائما تساوي الصفر

ومنه فإن:

$$P(x = 1) = 0 , P(x = 3) = 0$$

ثانيا: حساب كل من:

$$P(1 < X < 3)$$

$$P(2 < X < 7)$$

بالنسبة لـ $P(1 < X < 3)$ نلاحظ أن مجال المتغير العشوائي ضمن المجال المعرف للدالة: أي ان المطلوب هنا هو حياض الومساحة المحصورة بين واحد وثلاثة والمساحة كما تعرف عزيزي الطالب تحسب باستخدام الدالة الاصلية في هذا المجال:

تذكير خاص بحساب الدوال الاصلية


$$\int_a^b x^n dx = \frac{1}{n} x^{n+1} \Big|_a^b \quad \int_a^b \frac{1}{c} x^n dx = \frac{1}{cn} x^{n+1} \Big|_a^b$$

SAHLA MAHLA

$$\begin{aligned} P(1 < X < 3) &= \int_1^3 \frac{1}{9} x^2 d(x) = \frac{1}{27} x^3 \Big|_1^3 = \left(\frac{1}{27} 3^3 \right) - \left(\frac{1}{27} 1^3 \right) \\ &= \left(\frac{27}{27} \right) - \left(\frac{1}{27} \right) = \frac{26}{27} \end{aligned}$$

بالنسبة لـ $P(2 < X < 7)$ نلاحظ أن مجال المتغير العشوائي ضمن مجالين كما يلي:

الاحتمال هنا 0



نلاحظ أن المتغير العشوائي $2 < X < 7$ الى مجالين أحدهما معرف وهو $2 < X < 3$ والاخر غير معرف وهو

$3 < X < 7$

$$P(2 < X < 7) = \int_2^3 \frac{1}{9} x^2 d(x) + \int_3^7 f(x) d(x) = \int_2^3 \frac{1}{9} x^2 d(x)$$

$$\begin{aligned} P(2 < X < 7) &= \int_2^3 \frac{1}{9} x^2 d(x) + \int_3^7 f(x) d(x) = \int_2^3 \frac{1}{9} x^2 d(x) = \frac{1}{27} x^3 \Big|_2^3 \\ &= \left(\frac{1}{27} 3^3 \right) - \left(\frac{1}{27} 2^3 \right) = \left(\frac{9}{27} \right) - \left(\frac{4}{27} \right) = \frac{5}{27} \end{aligned}$$

ثالثا: أثبات أن $f(x)$ تمثل دالة كثافة

كما قلنا سابقا أنه من شروط أن تكون $f(x)$ تابع كثافة فإن:

$$\text{المصدر: الدكتور الطالب الجزائري} \quad \text{شروط دالة الكثافة} = \begin{cases} (1) \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1 \\ (2) f(x) \geq 0; \quad \forall x \in [-\infty; +\infty] \rightarrow 1 \geq f(x) \geq 0 \end{cases}$$

الدالة غير معرفة 0

الدالة غير معرفة 0

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx &= \int_{-\infty}^0 f(x) dx + \int_0^3 \frac{1}{9} x^2 dx + \int_3^{+\infty} f(x) dx = \frac{1}{27} x^3 \Big|_0^3 \\ &= \left(\frac{1}{27} 3^3 \right) - \left(\frac{1}{27} 0^3 \right) = \left(\frac{27}{27} \right) - \left(\frac{0}{27} \right) = 1 \end{aligned}$$

بما أن $\int_0^3 f(x) dx = 1$ فإن $f(x)$ دالة كثافة

تمرين:

بين أن $f(x)$ يمثل دالة احتمالية للمتغير العشوائي X وأحسب:


$$f(x = -1), \quad f(x = 0.5), \quad f(x = 1.5), \quad f(x = 9)$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{4}{5}x; & 0 < x \leq 1 \\ \frac{2}{5}(3 - x); & 1 < x \leq 2 \\ 0 & \text{عدا ذلك} \end{cases}$$

الحل:

من الملاحظ هنا ان المجال مقسوم الى قسمين ولكل قسم دالته الخاصة به

ملاحظة هذا الشكل الهدف منه توضيح مجالات تعريف الدالة لان شكل الدالة يرسم في محورين ونجن لا نحتاج ان نقوم بدراسة الدالة ورسمها فهو ليس موضوعنا



الدالة ليست معرفة في هذا المجال من $]-\infty; 0]$ وبالتالي قيمة الاحتمال هنا تساوي الصفر	الدالة معرفة في هذا المجال بالدالة $f(x) = \frac{4}{5}x$	الدالة معرفة في هذا المجال بالدالة $f(x) = \frac{2}{5}(3 - x)$	الدالة ليست معرفة في هذا المجال من $[2; +\infty]$ وبالتالي قيمة الاحتمال هنا تساوي الصفر
--	--	--	--

إثبات أن $f(x)$ تمثل دالة كثافة

كما قلنا سابقا أنه من شروط أن تكون $f(x)$ تابع كثافة فإن:

$$\text{شروط دالة الكثافة} = \begin{cases} 1) \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1 \\ 2) f(x) \geq 0; \quad \forall x \in [-\infty; +\infty] \rightarrow 1 \geq f(x) \geq 0 \end{cases}$$

الدالة غير معرفة 0

الدالة غير معرفة 0

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx &= \int_{-\infty}^0 f(x) dx + \int_0^1 \frac{4}{5} x dx + \int_1^2 \frac{2}{5} (3-x) dx + \int_2^{+\infty} f(x) dx \\ &= \int_0^1 \frac{4}{5} x dx + \int_1^2 \frac{2}{5} (3-x) dx = \frac{2}{5} x^2 \Big|_0^1 + \left(\frac{6}{5} x + \frac{1}{5} x^2 \Big|_1^2 \right) \\ &= \left[\frac{2}{5} 1 - \frac{2}{5} 0 \right] + \left[\left(\frac{6}{5} 2 - \frac{1}{5} 2^2 \right) - \left(\frac{6}{5} 1 - \frac{1}{5} 1^2 \right) \right] = \left[\frac{2}{5} \right] + \left[\frac{3}{5} \right] = 1\end{aligned}$$

ثانيا: حساب

$$P(1 < X < 4)$$

$$P(0.5 < X < 1.5)$$

حساب: $P(1 < X < 4)$

دائما قبل حساب أي مجال لابد
من الرجوع إلى المجال الذي
نقسمه فيه الدالة

$1 < X < 4$ تنتمي الى المجال التالي $[1, 4] \rightarrow P(1 < X < 4)$ وهذا المجال ينقسم إلى مجالين كالتالي:

المجال الأول: $[1, 2]$ والدالة في هذا المجال هي: $f(x) = \frac{2}{5}(3-x)$ وبالتالي

$$P(1 < X < 2) = \int_1^2 \frac{2}{5} (3-x) dx = \left(\frac{6}{5} x + \frac{1}{5} x^2 \Big|_1^2 \right) = \left[\left(\frac{6}{5} 2 - \frac{1}{5} 2^2 \right) - \left(\frac{6}{5} 1 - \frac{1}{5} 1^2 \right) \right] = \left[\frac{3}{5} \right]$$

المجال الثاني: $[2, 4]$ الدالة ليست معرفة هنا وبالتالي فهي تساوي الصفر

$$P(1 < X < 4) = \frac{3}{5} \text{ ومنه}$$

ملاحظة جد مهمة: كما قلنا سابقا لا فرق بين المجال المفتوح والمغلق هنا



الدالة ليست معرفة في هذا المجال من $]-\infty ; 0]$ وبالتالي قيمة الاحتمال هنا تساوي الصفر	الدالة معرفة في هذا المجال بالدالة $f(x) = \frac{4}{5} x$	الدالة معرفة في هذا المجال بالدالة $f(x) = \frac{2}{5} (3-x)$	الدالة ليست معرفة في هذا المجال من $]2 ; +\infty]$ وبالتالي قيمة الاحتمال هنا تساوي الصفر
---	---	---	---

حساب: $P(0.5 < X < 1.5)$

$0.5 < X < 1.5$ تنتمي الى المجال التالي $P(0.5 < X < 1.5) \rightarrow [0.5, 1.5]$ وهذا المجال ينقسم إلى مجالين كالتالي: $[0.5, 1] \sim [1, 1.5]$

المجال الأول: $[0.5, 1]$ والدالة في هذا المجال هي: $f(x) = \frac{4}{5}x$ وبالتالي:

$$P(0.5 < X < 1) = \int_{0.5}^1 \frac{4}{5}x dx = \frac{2}{5}x^2 \Big|_0^1 = \left[\frac{2}{5}1 - \frac{2}{5}0.5 \right] = \frac{2}{5}$$

المجال الثاني: $[1, 1.5]$ والدالة في هذا المجال هي: $f(x) = \frac{2}{5}(3 - x)$ وبالتالي:

$$P(1 < X < 1.5) = \int_1^{1.5} \frac{2}{5}(3 - x) dx = \left(\frac{6}{5}x + \frac{1}{5}x^2 \Big|_1^{1.5} \right) = \left[\left(\frac{6}{5}1.5 - \frac{1}{5}1.5^2 \right) - \left(\frac{6}{5}1 - \frac{1}{5}1^2 \right) \right] = \left[\frac{7}{20} \right]$$

$$P(0.5 < X < 1.5) = \frac{2}{5} + \frac{7}{20} = \frac{15}{20} \quad \text{ومنه}$$

المتغير الاحتمالي التراكمي

Cumulative Distribution function (cdf)

بفرض أن X متغير عشوائي متصل معرف على فضاء عينة S مداه $[a, b]$ ، وله اقتران

كثافة احتمالية f ، نعرف التوزيع التراكمي للمتغير العشوائي X بأنه الاقتران F الذي يحقق:

$$F(X) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt \quad -\infty < x < +\infty$$

وفي حالة كون اقتران الكثافة الاحتمالية بقاعدة واحدة يمكننا القول بأننا: التوزيع التراكمي للمتغير العشوائي المتصل هو كالتالي:

$$F(x) = \begin{cases} 0; & x \leq a \\ \int_a^x f(t) dt; & a < x < b \\ 1 & x \geq b \end{cases}$$

وكنتائج مباشرة على هذا التعريف يمكن استنتاج ما يلي:

$$\begin{cases} 1) F(-\infty) = 0 \\ 2) F(+\infty) = F(b^+) = 1 \\ 3) f(x) = \frac{df(x)}{d(x)} \\ 4) P(c < X < b) = F(b) - F(c) \end{cases}$$

نقصد بـ b^+ النهاية اليمنى للاقتزان التراكمي عند النقطة b

مثال:

إذا كان لدينا متغيرا عشوائيا وثابت وتمثل دالة كثافة

$$f(x) = \begin{cases} \frac{cx^2}{3} & -1 < X < 2 \\ 0 & \text{عدا ذلك} \end{cases} \quad \text{أولاً: أوجد قيمة الثابت } C$$

ثانياً: أوجد $F(x)$ ثم استعن به لحساب $P(0 < X < 2)$ و $P(X \geq 2)$

الحل:

أولاً: أوجد قيمة الثابت C

كما درسنا أنه حتى تكون الدالة دالة كثافة يجب توفر ما يلي:

$$\text{شروط دالة الكثافة} = \begin{cases} 1) \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1 \\ 2) f(x) \geq 0; \quad \forall x \in [-\infty; +\infty] \rightarrow 1 \geq f(x) \geq 0 \end{cases}$$

وبالتالي لابد أن يكون:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1 \rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{cx^2}{3} dx = 1$$

وبما أن $-1 < X < 2$ فإن حساب التكامل يكون حسب المجال الذي ينتهي له المتغير العشوائي


$$\int_{-1}^2 \frac{cx^2}{3} dx = \left. \frac{c}{9} x^3 \right|_{-1}^2 = \left[\left(\frac{c}{9} \cdot 8 \right) - \left(\frac{c}{9} \times -1 \right) \right] = \left[\frac{9c}{9} \right] = 1$$

ومنه فإن : $c = 1$ وبالتالي المعادلة كالتالي:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{3} & -1 < x < 2 \\ 0 & \text{عدا ذلك} \end{cases}$$

ثانيا: إيجاد $F(x)$

من خلال مجال تعريف التوزيع الاحتمالي نجد



الدالة ليست معرفة في هذا
المجال ومنه فإن $F(x)$
تساوي الصفر

الدالة معرفة في هذا المجال ومنه

$$F(x) = \int_{-1}^x f(t) dt$$

الدالة ليست معرفة في هذا المجال ومنه فإن
 $F(x)$ تساوي الصفر

$$F(x) = \int_{-\infty}^{-1} f(t) dt + \int_{-1}^x f(t) dt + \int_x^{\infty} f(t) dt$$

المصدر الأول للطالب الجزائري

$$F(x) = \int_{-1}^x f(t) dt = \int_{-1}^x \frac{t^2}{3} dt = \frac{t^3}{9} \Big|_{-1}^x = \left[\left(\frac{x^3}{9} \right) - \left(\frac{-1}{9} \right) \right] = \frac{x^3 + 1}{9}$$

ومنه فإن:

$$F(x) = \frac{x^3 + 1}{9}$$

وبالتالي فإن:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x \leq -1 \\ \frac{x^3+1}{9} & a < x < b \\ 1 & x \geq 2 \end{cases}$$

استخدام $F(x)$ لحساب $P(0 < X < 2)$ $P(X \geq 2)$

$$P(0 < X < 2) = F(2) - F(0) = \frac{2^3 + 1}{9} - \frac{0^3 + 1}{9} = \frac{9}{9} - \frac{1}{9}$$

$$P(0 < X < 2) = \frac{8}{9} \text{ ومنه}$$

$$P(X \geq 2) = F(2) = \frac{2^3 + 1}{9} = 1$$

التوقع الرياضي والتباين

Mathematical Expectation

التوقع الرياضي: إذا كان X متغير عشوائي متصل فإن القيمة المتوقعة $E(X)$ له تعطى حسب العلاقة التالية:

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \mu$$

التباين: لحساب التباين والانحراف المعياري لتوزيع احتمالي مستمر التباين يرمز له بـ $Var(X)$ ويساوي

$$Var(X) = \sigma_X^2 = E(X^2) - [E(X)]^2$$

الانحراف المعياري يرمز له بـ σ_X ويساوي

$$\sigma_X = \sqrt{Var(X)} = \sqrt{E(X^2) - [E(X)]^2}$$

للتوضيح فإن $E(X^2)$ يحسب كما يلي:

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx$$

مثال:

إذا كان X متغيراً عشوائياً متصلاً يمثل الفترة الزمنية، مقبسة بالساعات، التي يعمل فيها جهاز حاسب آلي قبل الإصابة بعطل، وكانت دالة الكثافة للمتغير X ممثلة كما يلي:

$$f(x) = \begin{cases} Ce^{\frac{-x}{100}} & x \geq 0 \\ 0 & \text{عدا ذلك} \end{cases}$$

أوجد مايلي:

(أ) أوجد قيمة الثابت C

(ب) أوجد تابع التوزيع $F(x)$

(ت) أوجد احتمال أن يعمل الحاسب الآلي في الفترة الزمنية بين 50 و 150 ساعة قبل أن يتعطل

(ث) أوجد احتمال أن يعمل الحاسب الآلي لفترة زمنية أق من 100 ساعة,

(ج) أوجد متوسط عمل الحاسب الآلي $E(X)$

(ح) أوجد الانحراف والتباين للمتغير العشوائي X

الحل:

أولاً: إيجاد قيمة الثابت C

بما أن الدالة تمثل تابع كثافة فإن:

$$\text{شروط دالة الكثافة} = \begin{cases} 1) \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1 \\ 2) f(x) \geq 0; \quad \forall x \in [-\infty; +\infty] \rightarrow 1 \geq f(x) \geq 0 \end{cases}$$

تذكير خاص بحساب الدوال الاصلية للدالة الأسية

$$\int_a^b e^{nx} dx = \frac{1}{n} e^{nx} \Big|_a^b$$

أي أن:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} Ce^{\frac{-x}{100}} dx = 1 \rightarrow \int_{-\infty}^0 Ce^{\frac{-x}{100}} dx + \int_0^{+\infty} Ce^{\frac{-x}{100}} dx = 0 + C(-100)e^{\frac{-x}{100}} \Big|_0^{+\infty} = 1$$

$$C(-100)e^{\frac{-x}{100}} \Big|_0^{+\infty} = [C(-100)e^{\frac{-\infty}{100}}] - [C(-100)e^{\frac{0}{100}}] = 1$$

كما هو معروف أن أي عدد يرفع في الاس إلى الصفر
في الاس إلى ناقص ما لانهاية فإنه
سؤول إلى الصفر

كما هو معروف أن أي عدد يرفع في الاس إلى الصفر فإنه يساوي الواحد أي:
 $C(-100)e^{\frac{0}{100}} = C(-100)$

$$-C(-100) = 1 \rightarrow C = \frac{1}{100}$$

ومنه:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{100} e^{\frac{-x}{100}} & X \geq 0 \\ 0 & \text{عدا ذلك} \end{cases}$$

ثانياً: إيجاد تابع التوزيع $F(x)$

$$F(X) = \int_{-\infty}^x f(t) dt \quad -\infty < x < +\infty$$

$$F(X) = \int_{-\infty}^0 f(t) dt + \int_0^x f(t) dt$$

$$F(X) = \int_{-\infty}^0 \frac{1}{100} e^{\frac{-t}{100}} dt + \int_0^x \frac{1}{100} e^{\frac{-t}{100}} dt = 0 + \left[-1e^{\frac{-t}{100}} \right]_0^x = -1e^{\frac{-x}{100}} + 1$$

ومنه فإن دالة التوزيع كالتالي:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ -1e^{\frac{-x}{100}} + 1 & x \leq 0 \end{cases}$$

ثالثاً: إيجاد احتمال أن يعمل الحاسب الآلي في الفترة الزمنية بين 50 و 150 ساعة قبل أن يتعطل

$$P(50 < X < 150) = F(150) - F(50) = \left[-1e^{\frac{-150}{100}} + 1 \right] - \left[-1e^{\frac{-50}{100}} + 1 \right] = \left[-e^{\frac{-3}{2}} + 1 \right] - \left[-e^{\frac{-1}{2}} + 1 \right] = -e^{\frac{-3}{2}} + e^{\frac{-1}{2}} = 0.383$$

$$P(50 < X < 150) = 0.383$$

ومنه فإن:

رابعاً: إيجاد احتمال أن يعمل الحاسب الآلي لفترة زمنية أقل من 100 ساعة

$$P(X < 100) = F(100) = \left[-1e^{\frac{-100}{100}} + 1 \right] = 0.632$$

خامسا: إيجاد متوسط عمل الحاسب الالى $E(X)$

تذكير خاص بحساب الدوال الاصلية للدالة الأسية

$$\int_a^b x e^{cx} dx = \frac{1}{c^2} e^{cX} (cx - 1) \Big|_a^b$$

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \int_{-\infty}^0 x f(x) dx + \int_0^{+\infty} x f(x) dx = \int_{-\infty}^0 x \frac{1}{100} e^{-\frac{x}{100}} dx + \int_0^{+\infty} x \frac{1}{100} e^{-\frac{x}{100}} dx \\ &= \frac{1}{100} \int_0^{+\infty} x e^{-\frac{x}{100}} dx = \frac{1}{\left(-\frac{1}{100}\right)^2} e^{-\frac{1}{100}X} \left(-\frac{1}{100}x - 1\right) \Big|_0^{+\infty} \frac{1}{100} \\ &= \left[\left[10000 e^{-\frac{1}{100}+\infty} \left(-\frac{1}{100} + \infty - 1\right) \right] - \left[10000 e^{-\frac{1}{100}0} \left(-\frac{1}{100}0 - 1\right) \right] \right] \frac{1}{100} \\ &= 0 - [-10000] \frac{1}{100} \\ \mathbf{E(X) = 100} \end{aligned}$$

سادسا: إيجاد $Var(X)$

$$Var(X) = \sigma_X^2 = E(X^2) - [E(X)]^2$$

تذكير خاص بحساب الدوال الاصلية للدالة الأسية

$$\int_a^b x^2 e^{cx} dx = e^{cX} \left(\frac{x^2}{c} - \frac{2x}{c^2} + \frac{2}{c^3} \right) \Big|_a^b$$

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx = \int_{-\infty}^0 x^2 f(x) dx + \int_0^{+\infty} x^2 f(x) dx \\ &= \frac{1}{100} \int_0^{+\infty} x^2 e^{-\frac{x}{100}} dx = e^{-\frac{1}{100}x} \left(\frac{x^2}{\frac{-1}{100}} - \frac{2x}{\left(\frac{-1}{100}\right)^2} + \frac{2}{\left(\frac{-1}{100}\right)^3} \right) \Big|_0^{+\infty} \frac{1}{100} \\ &= \left[\left[e^{-\frac{1}{100}\infty} \left(\frac{\infty^2}{\frac{-1}{100}} - \frac{2\infty}{\left(\frac{-1}{100}\right)^2} + \frac{2}{\left(\frac{-1}{100}\right)^3} \right) \right] - \left[e^{-\frac{1}{100}0} \left(\frac{0^2}{\frac{-1}{100}} - \frac{20}{\left(\frac{-1}{100}\right)^2} + \frac{2}{\left(\frac{-1}{100}\right)^3} \right) \right] \right] \frac{1}{100} \\ &= 20000 \end{aligned}$$

$$E(X^2) = 20000$$

ومنه فإن:

$$Var(X) = 20000 - [100]^2 = 10000$$

وبتالي فإن الانحراف المعياري الذي يمثل جذر التباين فإن:

$$\sqrt{Var(X)} = \sigma_x = \sqrt{10000} = 100$$

SAHLA MAHLA

المصدر الأول للطالب الجزائري



التوزيعات الاحتمالية المنفصلة والمتصلة

سوف نستعرض في هذا القسم بعض التوزيعات الاحتمالية الهامة والتي لها دور كبير في وصف الظواهر الطبيعية في كل مجال من مجالات البحث العلمي تقريبا، إذ إن بعض بعض هذه التوزيعات يخص الالمتغير العشوائي المتقطع مثل التوزيع الثنائي وتوزيع بواسون، وبعضها الآخر يتعلق بمتغير عشوائي مستمر أهمها التوزيع الطبيعي.

تتميز هذه التوزيعات الاحتمالية بدوال كثافة مميزة والتي تكون تابعة لوسطاء متعلقة بالموضوع المدروس وستكون لهذه التوزيعات تطبيقات واسعة تساعد الباحث على استيعاب أفضل للمفاهيم التي تم دراستها سابقا،

المصدر الاول للطالب الجزائري

التوزيعات الاحتمالية المنفصلة

The Discrete Probability Distributions

هناك عدة توزيعات متقطعة نظرية لها تطبيقات واسعة في صنع القرارات في عالم الشركات والاعمال، يدعى التوزيع الاحتمالي توزيعا نظريا عندما تستخدم الخواص الرياضية لمتغيره العشوائي في إيجاد احتمالاته. تختلف مثل هذه التوزيعات عن التوزيعات التي يتم الحصول عليها بأسلوب شخصي أو من المشاهدات، وسوف نركز فقط على توزيعين مهمين هما التوزيع ذي الحدين الاحتمالي، والتوزيع البواسوني. وذلك لأهميتها واستخدامهما الواسع في الاقتصاد والتجارة.

اولا: التوزيع ذي الحدين الاحتمالي

The Binomial Distribution

ينسب بعض المؤرخين اول استخدام للتوزيع الثنائي الحدين الى جاكوب برنولي (Jakob Bernoulli) وهو عالم رياضيات سويسري بارز في القرن السابع عشر، هو توزيع نظري يصف تجارب لها نتيجتين محتملتين فقط. هناك كثير من الاحداث ينطبق عليها هذا التوزيع. فعلى سبيل المثال: نظام ضبط الجودة في المصانع يصف أي سلعة يتم اختبارها على أنها معيبة أو غير معيبة. وكذلك الأمر عند التفاوض لابرار عقد فتكون النتيجة اما ابرار العقد أم لا: وكذلك الشراء اما نشترى أم لا، وكذلك عند اجتياز مسابقة توظيف ستكون النتيجة ننجح أم لا، وكذلك عند تقديم اقتراح لمدير في العمل ستكون النتيجة الموافقة أم لا. وبهذا نلاحظ ان هناك دائما اجابتين أو بالاحرى نتيجتين فقط.

الشروط التي يجب أن يستوفها التوزيع الاحتمالي الثنائي:

- (1) لكل محاولة نتيجتان ممكنتان: نجاح أو فشل.
- (2) هناك عدد ثابت من المحاولات المتماثلة في كل تجربة عددها n .
- (3) محاولات التجربة مستقلة بعضها عن بعض. وهذا يعني أنه إذا كانت نتيجة إحدى المحاولات "نجاحا"، فهذا لا يؤثر على احتمال أن تكون نتيجة محاولة أخرى، "نجاحا" أيضا.
- (4) يجب أن تكون العملية متلائمة مع توليد نتائج بعضها نجاح والآخر فشل. ويجب أن تكون القيمة المرتبطة باحتمال النجاح. " p " ثابتة في جميع محاولات التجربة.
- (5) إذا كانت " p " تمثل احتمال النجاح فيغن احتمال الفشل هو " q " حيث:

$$q = 1 - p$$

مثال:

شركة هاو سهولد سيكيورتي هي شركة تنتج وتركب 300 وحدة من وحدات الأمان المنزلية بحسب الطلب اسبوعيا. وقد تم تسعير هذه الوحدات بحيث يتضمن السعر خدمة تركيبها التي تنفذ من قبل اثنين من التقنيين لمدة يوم واحد بالنسبة لوحدة التي تحوي مشكلة، سواء كانت مشكلة تصنيع أو مشكلة تصميم فإنه يتطلب تعديل الوحدة في موقع التركيب وينتج عن ذلك عملية تركيب تستغرق أكثر من يوم. تفيد معلومات الدراسة الموسعة التي أنجزتها الشركة عن نظامها المتعلق بالتصنيع والتصميم أن 10 بالمائة من وحدات الأمان التي تنتجها الشركة تحوي مشاكل مما يجعل تركيبها يستغرق أكثر من يوم. يمكن تطبيق التوزيع ذي الحدين على هذه الحالة وذلك لتوفر الشروط التالي:

(1) هناك نتيجتان فقط محتملتان عند تركيب الوحدة: إما أنها جيدة أو أنها معيبة ونعتبر الكشف عن وحدة معيبة نجاحا.

(2) كل وحدة قد تم تصميمها وتصنيعها بنفس الطريقة.

(3) أن نجد أن إحدى الوحدات سليمة أو معيبة أمر مستقل عن كون الوحدة السابقة سليمة أو معيبة.

(4) احتمال أن تكون الوحدة معيبة $p = 0.10$ ثابت بالنسبة لكل وحدة.

(5) احتمال أن تكون الوحدة سليمة $q = 1 - p = 0.90$ ثابت بالنسبة لكل وحدة.

لايجاد سبب العيب (تصنيعي أو تصميمي)، أوجدت مجموعة ضمان الجودة في الشركة خطة تفكيك عينة عشوائية مؤلفة من أربع وحدات كل أسبوع، وبما أن حجم العينة 4 يعتبر صغيرا بالنسبة لحجم

المجتمع

لنعتبر أن عدد الوحدات المعيبة هو المتغير العشوائي X المتقطع الذي يمكن أن يأخذ القيم: $p = 0, 1, 2, 3, 4$

نفرض أن: المصدر الأول للطالب الجزائري

G يمثل الجيدة غير المعيبة واحتمال الحصول على وحدة جيدة هو $p(G) = 0.90$

D يمثل الوحدات المعيبة واحتمال الحصول على وحدة معيبة هو $p(D) = 0.10$

هناك أكثر من طريقة لحساب احتمال أن يأخذ المتغير أيا من القيم المتقطعة السابقة. ومن

هذه الطرق أن ماييلي:

وبما أننا افترضنا سابقا فرضية الاستقلالية لذلك يمكن استخدام قاعدة الضرب كما تطرقنا لذلك سابقا.

أولا: $x = 0$ معناه لا توجد وحدة معيبة أي كل الوحدات جيدة

$$p(G \cap G \cap G \cap G) = p(G \cap G \cap G \cap G) = p(G)p(G)p(G)p(G) = (0.90)(0.90)(0.90)(0.90) = (0.90)^4 = 0.6561$$

ثانيا: $x = 1$ يمكن ايجاد احتمال أن هناك وحدة واحدة معيبة من أصل أربع وحدات في العينة باستخدام قاعدة الضرب للأحداث المستقلة وقاعدة الجمع للأحداث المتنافية.

$$p(x = 1) = p(D \cap G \cap G \cap G) + p(G \cap D \cap G \cap G) + p(G \cap G \cap D \cap G) + p(G \cap G \cap G \cap D) = (0.90)^3(0.10) + (0.90)^3(0.10) + (0.90)^3(0.10) + (0.90)^3(0.10) = 3(0.90)^3(0.10) = 0.2916$$

ويمكن تلخيص ما سبق في الجدول التالي:

النتائج	$q = 1 - p$	عدد الوحدات المعيبة والسليمة	عدد الطرق C_n^x
GGGG	$(0.90)^4(0.10)^0$ $1(q)^4(p)^0$	0 معيبة يقابله $(0.10)^0$ 4 سليمة $(0.90)^4$	1 $C_4^0 = 1$
GGGD GGDG GDGG DGGG	$4(0.90)^3(0.10)^1$ $4(q)^3(p)^1$	1 معيبة يقابله $(0.10)^0$ 3 سليمة $(0.90)^3$	4 $C_4^1 = 4$
GGDD GDDG DDGG DGGD GDGD DGDG	$6(0.90)^2(0.10)^2$ $6(q)^2(p)^2$	2 معيبة يقابله $(0.10)^2$ 2 سليمة $(0.90)^2$	6 $C_4^2 = 6$
DDDG DDGD DGDD GDDD	$4(0.90)^1(0.10)^3$ $4(q)^1(p)^3$	3 معيبة يقابله $(0.10)^3$ 1 سليمة $(0.90)^1$	4 $C_4^3 = 4$
DDDD	$1(0.90)^0(0.10)^4$ $1(q)^0(p)^4$	4 معيبة يقابله $(0.10)^4$ 0 سليمة $(0.90)^0$	1 $C_4^4 = 1$
من خلال المثال نلاحظ أن			
$p(x) = C_n^x(q)^{n-x}(p)^x$			

عندما تكون لدينا محاولات n ذات احتمال p نجاح في كل محاولة، يصبح احتمال نجاحات

المتغير العشوائي X على النحو التالي:

معالم التوزيع الثنائي كالتالي:

n تمثل عدد المحاولات

p تمثل احتمالا نجاح كل محاولة وكما قلنا سابقا نفس الاحتمال لكل المحاولات وكل محاولة

مستقلة عن باقي المحاولات

$$p(x) = C_n^x(p)^x(q)^{n-x} \quad x = 0; \dots \dots n$$

ويشار إلى الاحتمال التراكمي للمتغير العشوائي X أو أصغر بالدلالة $F(x)$ وعندما يكون

$x = x_0$ فإن:

$$F(x) = P(X \leq x_0)$$

ويتم حساب متوسط المتغير وتباينه وانحرافه المعياري على النحو المبين ادناه:

المتوسط يرمز له بـ $E(X)$ أو μ_X ويساوي

$$E(X) = \mu_X = np$$

التباين يرمز له بـ $Var(X)$ ويساوي

$$Var(X) = \sigma_X^2 = np(1 - p)$$

الانحراف المعياري يرمز له بـ σ_X ويساوي

$$\sigma_X = \sqrt{Var(X)} = \sqrt{np(1 - p)}$$

كما يتم اشتقاق منوال المتغير X على النحو التالي:

إذا لم يكن $p(1 + n)$ عددا صحيحا: $\tilde{\mu} =$ الحد الأدنى لـ $[p(1 + n)]$

إذا كان $p(1 + n)$ عددا صحيحا: $\tilde{\mu} = p(1 + n) - 1$ و $[p(1 + n)]$

مثال:

إذا كان احتمال نجاح عملية جراحية هو 0.9 فإذا أجريت العملية لعشرة مرضى لهم نفس

الظروف ونفس الاحتمال فاحسب ما يلي:

(a) احتمال نجاح العملية لسبعة مرضى

(b) احتمال نجاح العملية لجميع المرضى

(c) احتمال نجاح العملية لسبعة مرضى على الأقل.

(d) احتمال نجاح العملية لسبعة مرضى على الأكثر

(e) متوسط عدد المرضى الذين سينجحون في العملية.

(f) وتباين عدد المرضى الذين سيجرون العملية.

(g) منوال عدد المرضى الذين سيجرون العملية.

الحل:

تحديد المعطيات

$$n=10 \quad p=0.9 \quad q=0.1$$

نلاحظ ان التوزيع هو توزيع ثنائي وبالتالي فإن:

$$p(x) = C_n^x (p)^x (q)^{n-x}$$

(a) احتمال نجاح العملية لسبعة مرضى أي: $p(7)$

$$p(7) = C_{10}^7 (p)^7 (q)^{10-7}$$

$$p(7) = C_{10}^7 (0.9)^7 (0.1)^{10-7}$$

(b) احتمال نجاح العملية لجميع المرضى أي: $p(10)$

$$p(10) = C_{10}^{10} (p)^{10} (q)^{10-10}$$

$$p(10) = C_{10}^{10} (0.9)^{10} (0.1)^{10-10}$$

$$p(10) = (0.9)^{10}$$

(c) احتمال نجاح العملية لسبعة مرضى على الأقل. أي: أقل عدد للذين تنجح عملياتهم هو سبعة بمعنى من سبعة فما فوق بمعنى سبعة أو ثمانية أو تسعة أو عشرة وهنا نعبر عنها احصائيا كالتالي:

$$p(x \geq 7)$$

عزيزي الطالب لابد ان تفرق بين **على الأقل** وكلمة **واقل**

مثلا لو كان هنا السؤال

احتمال نجاح العملية لسبعة مرضى و أقل هنا نقصد سبع أو

سته أو خمسة أو أربعة أو ثلاثة أو اثنين أو واحد أو صفر

$$p(x \leq 7) = p(7) + p(6) + p(5) + p(4) + p(3) + p(2) + p(1) + p(0)$$

$$p(x \geq 7) = p(7) + p(8) + p(9) + p(10)$$

$$p(x \geq 7) = C_{10}^7 (p)^7 (q)^{10-7} + C_{10}^8 (p)^8 (q)^{10-8}$$

$$+ C_{10}^9 (p)^9 (q)^{10-9} + C_{10}^{10} (p)^{10} (q)^{10-10}$$

$$p(x \geq 7) = C_{10}^7 (0.9)^7 (0.1)^{10-7} + C_{10}^8 (0.9)^8 (0.1)^{10-8} + C_{10}^9 (0.9)^9 (0.1)^{10-9} + C_{10}^{10} (0.9)^{10} (0.1)^{10-10}$$

(d) احتمال نجاح العملية لسبعة مرضى على الأكثر أي أكثر عدد للناجحين هو سبعة وبالتالي من سبعة

الى صفر بمعنى نجاح سبعة أو ستة أو خمسة أو أربعة أو ثلاثة أو اثنين أو واحد أو صفر. وهنا نعبر عنها


احصائيا كالتالي:

$$p(x \leq 7) = p(7) + p(6) + p(5) + p(4) + p(3) + p(2) + p(1) + p(0)$$

أو

$$p(x \leq 7) = 1 - [p(8) + p(9) + p(10)]$$

$$p(x \leq 7) = 1 - p(x \geq 8)$$



$$p(x \leq 7) + p(x \geq 8) = 1 \rightarrow p(x \leq 7) = 1 - p(x \geq 8)$$

ومنه:

$$p(x \leq 7) = 1 - [c_{10}^8(p)^8(q)^{10-8} + c_{10}^9(p)^9(q)^{10-9} + c_{10}^{10}(p)^{10}(q)^{10-10}]$$

$$p(x \leq 7) = 1 - [c_{10}^8(0.9)^8(0.1)^{10-8} + c_{10}^9(0.9)^9(0.1)^{10-9} + c_{10}^{10}(0.9)^{10}(0.1)^{10-10}]$$

(e) متوسط عدد المرضى الذين سينجحون في العملية. أي التوقع والذي يساوي:

$$E(X) = np$$

$$E(X) = 10 \times 0.9 = 9$$

$$E(X) = 9$$

(f) تباين عدد المرضى الذين سيجرون العملية. أي:

$$Var(X) = \sigma_X^2 = np(1-p)$$

$$Var(X) = \sigma_X^2 = 10 \times 0.9(1 - 0.9)$$


$$Var(X) = \sigma_X^2 = 0.9$$

(g) منوال عدد المرضى الذين سيجرون العملية.

$$\tilde{\mu} = p(1 + n) = 0.9(1 + 10) = 9.9 \cong 9$$

ملاحظات:


إذا كانت p قيمة النجاح تساوي 0.5 فإن التوزيع ذي الحدين يكون متماثلاً كالتوزيع الطبيعي (بالنسبة التوزيع الطبيعي سيتم التطرق له في التوزيعات المتصلة فيما يلي) والشكل التالي يبين ذلك:



يتبين من الشكل أعلاه التوزيع ذي الحدين لعينات مختلفة الاحجام مع ثبات متمائل بغض النظر عن حجم العينة

عندما تختلف قيمة p عن 0.5 في أي من الاتجاهين فإن التوزيع ذي الحدين يلتوي نحو اليمين (إذا كان $p < q$ يكون التوزيع ملتوي نحو اليمين ويسمى التواء موجب) أو نحو اليسار (إذا كان $p > q$ يكون التوزيع ملتوي نحو اليسار ويسمى التواء سالب) ويصبح الالتواء أشد كلما كان حجم العينة صغيراً وعندما تقترب قيمة p من 0 أو 1

كما أن الالتواء يتضاءل ويقترب من التوزيع الطبيعي كلما كبر حجم العينة (سيتم التطرق لتقريب التوزيع الثنائي إلى توزيع طبيعي عند دراسة التوزيع الطبيعي) والشكل الموالي يبين ذلك:



ثانيا: التوزيع البواسوني The Poisson Distribution

درسنا التوزيع ذي الحدين الذي يحتوي على حدثين حادث نجاح والآخر فشل، إلا أنه توجد العديد من الحالات يمكننا فقط تحديد حالات النجاح ولا يمكننا حساب عدد مرات الفشل. فعلى سبيل المثال مستشفى الامومة في قالمة يقدم خدمات الطوارئ لمرضى الكورونا، في هذه الحالة يمكننا بسهولة حساب عدد اتصالات حالات الطوارئ التي تستجيب لها الوحدات في الساعة. لكن التساؤل هنا كيف يمكن عد الاتصالات التي لم يتم تلقيها؟ من الواضح هنا أنه من الصعب بل من المستحيل معرفة عدد النتائج الممكنة (نجاح + فشل)، فإذا كنا لا نستطيع حساب العدد الكلي للنتائج الممكنة عندئذ لا يمكن تطبيق التوزيع ذي الحدين ولكن في هذه الحالة قد نستطيع تطبيق توزيع بواسن.

خصائص توزيع بواسون: يصف توزيع بواسون عملية تمتد على مدى فترة من الزمن أو تتعلق بحيز محدد أو أي وحدة تحقق محددة بشكل جيد، تحدث النتائج الممكنة التي ندرسها مثل اتصالات الطوارئ وعدد الحفر بشكل عشوائي ونعد النتائج التي تحدث خلال شريحة معينة من الزمن من حيز ما. يمكن أن نعد عدد اتصالات الطوارئ خلال ساعة أو عدد الحفر لمسافات طولها ميلان من إحدى الطرقات. ونسي هذه الأعداد نجاحات مع أنها قد تكون غير مرغوبة.

إن الأرقام التي يمكن عدها هنا (عدد النجاحات) هي: 0, 1, 3,
SAHLA MAHLA
المصدر الأول للطالب الجزائري

يتعامل هذا المتغير العشوائي مع حوادث نادرة الوقوع

قائمة المراجع

1. الاحصاء للاداريين والاقتصاديين، دلال القاضي، دارومكتبة الحامد، عمان، 2005.
2. الاحصاء، محمود حسن المشهداني، بيت الحكمة جامعة بغداد، 1989
3. الاحصاء والاحتمالات نظرية وتطبيقات، حميد عويد مشرف العلقة، دار جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 2019.
4. مدخل الى نظرية الاحتمالات الجزء الأول، ويليام فللر، ترجمة انيس اسماعيل كنجو، جامعة الملك سعود النشر العلمي والمطابع، المملكة العربية السعودية، 2000.
5. مبادئ الاحصاء والاحتمالات، عدنان بن ماجد عبد الرحمان بري، جامعة الملك سعود النشر العلمي والمطابع، المملكة العربية السعودية، 1997.
5. مبادئ في الاحتمالات والاحصاء، مبارك أسبرديب، جامعة تشرين، 2009.
6. مقدمة في نظرية الاحتمالات، جبار عبد مضيحي، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، 2011.
7. أساسيات الاحتمالات. خالد زهدي خواجه، المعهد العربي للتدريب والبحوث الاحصائية. الكويت. 2009.
8. مبادئ الاحصاء والاحتمالات للعلوم الادارية والتطبيقية، محمد محمد المزاح، منشورات جامعة العلوم والتكنولوجيا، السودان، 2013.
9. الاحصاء في عالم الاعمال نهج صنع القرار الجزء الاول، ترجمة ماهر دريد بدوي، دار جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 2015.
10. الاحصاء في عالم الاعمال نهج صنع القرار الجزء الثاني، ترجمة ماهر دريد بدوي، دار جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 2015.